

3. *Ceterach*

2. **Ph. sagittata** (DC.) Guinea & Heywood in Collect. [sagittáta]
 Bot. (Barcelona) 4: 246 (1954)

Scolopendrium sagittatum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 238 (1815) [basi6n.]

Asplenium sagittatum (DC.) A.J. Bange in Bull. Mens. Soc. Linn. Soc. Bot. Lyon 21: 84 (1952)

A. hemionitis auct.

Ph. hemionitis auct.

S. hemionitis auct.

Ind. loc.: "J'ai cueilli cette plante parmi les rochers humides et dans les grottes, pr6s Marseille, au lieu dit Marseille-vaire, sous l'hermitage de Saint-Michel d'eau douce..." [Francia]

lc.: Lám. 37

Rizoma corto, con páleas lanceoladas de color castaño. Frondes (8)10-30(35) cm, persistentes; pecíolo subigual o mayor que la lámina; ésta (6)8-17(20) × (4)5,5-8(10) cm; la de las frondes jóvenes, ovada, cordada en la base y obtusa en el ápice; la de las frondes adultas, hastada, con el segmento central oblongo-lanceolado y dos aurículas basales, generalmente divaricadas y agudas, a veces obtusas y poco salientes, raramente lobadas; raquis a veces paleáceo; nervios espaciados, bifurcados en su mayoría lejos de la base, no dilatados en el ápice. Soros de hasta 1,3 cm, oblongos, bastante anchos; indusio de margen entero. Esporas (24)30-33(36) µm de diámetro, ovoideas, castaño-claras, con perisporio laxamente reticulado y verrucoso. $2n = 72$; $n = 36^*$.

Grietas de roquedos calizos en lugares bastante umbrosos y húmedos; 0-1000 m, I-XI. Región mediterránea. Baleares y puntos del litoral mediterráneo peninsular. **Esp.**: (A) Ca Cs PM (T) V. **N.v.**, *cat.*: lengua de cervol sagitada, lengua de cero (en Baleares).

HÍBRIDOS

Asplenium × **Phyllitis**

× *Asplenophyllitis* Alston

Asplenium adiantum-nigrum × **Phyllitis scolopendrium** subsp. **scolopendrium**

Asplenium adiantum-nigrum var. *microdon* T. Moore, Brit. Ferns 2: 76, 89 (1860) [nom. subst.]

× *Asplenophyllitis jacksonii* Alston in Proc. Linn. Soc. London 152: 142 (1940)

Observaciones.—Su existencia en el territorio de la Flora no ha sido suficientemente demostrada.

Asplenium billotii × **Phyllitis scolopendrium** subsp. **scolopendrium**

Asplenium marinum var. *microdon* T. Moore, Ferns Gr. Brit., tab. 38 (1855) [basi6n.]

× *Asplenophyllitis microdon* (T. Moore) Alston in Proc. Linn. Soc. London 152: 140 (1940)

Observaciones.—Su existencia en el territorio de la Flora no ha sido suficientemente demostrada.

3. *Ceterach* Willd. [nom. cons.]*

[*Céterach* n. — ár. (diversas grafías) *šātiraš* = doradilla y otras plantas]

Rizoma corto, vertical, revestido de páleas lanceolado-acuminadas, clatradadas. Frondes fasciculadas; pecíolo corto, paleáceo; lámina gruesa, 1-pinnatipartida, glabra en el haz, densamente paleácea en el envés; nervadura dicótoma, anastomosada en los márgenes. Soros oblongo-lineares; indusio rudimentario o nulo. Esporas ovoideas, de simetría bilateral; perisporio equinulado-reticulado.

* J. Ormonde