

2. *Notholaena***Ch. hispanica** × **Ch. maderensis***Ch. × prototinaei* Rasbach, Reichst. & Schneller in *Webbia* 37: 45 (1983)**Ch. hispanica** × **Ch. tinaei***Ch. × iberica* Rasbach & Reichst. in *Webbia* 35: 264 (1982)**Ch. maderensis** × **Ch. tinaei***Ch. × kochiana* Rasbach, Reichst. & Schneller in *Webbia* 37: 48 (1983)**2. Notholaena R. Br.***[*Notholáena* f. – gr. *nóthos* = bastardo; lat. *laena* = manto. Porque el indusio está reemplazado por cerdas, escamillas o la lana de la fronde]

Rizoma paleáceo. Frondes esparcidas, a veces subfasciculadas; pecíolo y raquis castaño-rojizos; lámina varias veces pinnada, cubierta de páleas escamosas y pelos pluricelulares, con nervadura dicótoma; pinnas o pínulas sésiles o subsésiles, articuladas con el raquis, con margen revuelto (pseudoindusio) y envés densamente cubierto de páleas y pelos pluricelulares. Esporangios en varias filas en la zona terminal de los nervios. Esporas triletas, subsféricas.

Bibliografía.—R.E.G. PICH SERMOLLI in *Taxon* 31: 162-163 (1981); in *Webbia* 37: 112-117 (1983); in *Webbia* 39: 179-189, tab. 1-2 (1985); R. TRYON & A. TRYON in *Taxon* 29: 160-161 (1980).

1. N. marantae (L.) Desv. in *J. Bot. Agric.* 1: 92 (1813)

[Marántae]

subsp. **marantae***Acrostichum marantae* L., Sp. Pl.: 1071 (1753) [basión.]*Cheilanthes marantae* (L.) Domin in *Biblioth. Bot.* 85: 133 (1914)*Ind. loc.*: "Habitat in Europa australi"*Ic.*: Lám. 17

Rizoma horizontal, grueso, densamente cubierto de páleas linear-lanceoladas de color ferrugíneo. Frondes de hasta 35 cm; pecíolo y raquis castaño-rojizos, con abundantes páleas linear-lanceoladas, ferrugíneas; lámina menor que el pecíolo, 2-pinnada, ovado-lanceolada; pínulas oblongas, enteras o lobuladas en la base, con margen revuelto y reborde membranáceo estrecho; envés densamente cubierto de páleas triangular-acuminadas mezcladas con pelos pluricelulares flexuosos. Esporas 46-62 μm , con perisporio crestado-reticulado. $2n = 58$; $n = 29$.

Grietas de rocas, repisas de roquedos y pedregales, generalmente en substratos ultrabásicos no calizos; 0-1200 m. III-XII. C y S de Europa, N de África, Anatolia, Himalaya, Yemen y Etiopía; en la región macaronésica, la subsp. *subcordata* (Cav.) G. Kunkel. Esparcido en zonas mediterráneas y submediterráneas de la Península Ibérica. **Esp.**: B (C) CR Cs Cu Ge H (L) Ma Po (T) To (V). **Port.**: TM.

* F. Muñoz Garmendia