

1. *Pteris*

dispuestos en líneas marginales que ocupan de 1/3 a 2/3 de la parte basal de los segmentos; pseudoindusio entero, escarioso y persistente. Esporas tetraédricas, muricadas. $2n = 58^*$.

Lugares húmedos y umbrosos. III-VIII. Macaronesia (excepto Cabo Verde), Tánger, Algeciras y Sintra. **Esp.:** Ca. **Port.:** E.

2. *P. cretica* L., Mant. Pl.: 130 (1767)

[crética]

Ind. loc.: "Habitat in Creta, Ilva insula" [isla de Elba, Italia; indicación cretense probablemente errónea]

lc.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 1(1): 104 Abb. 79-80 (1984)

Rizoma rastrero, con páleas lanceoladas castaño-oscuras. Frondes de hasta 80 cm; lámina algo mayor que el pecíolo, 1-pinnada; pinnas hasta 7 pares, enteras o serradas, las inferiores bi o trifurcadas. Soros dispuestos en una línea marginal, faltando en el ápice de las pinnas; pseudoindusio linear, membranáceo. Esporas tetraédricas, con las caras convexas, verrugosas. $2n = 58^*$, 87^* , 116^* , 174^* , 272^* ; $n = 29^*$, 58^* , 87^* .

Roquedos umbrosos junto a los cursos de agua. V-IX. Región mediterránea, E de África tropical, S de África, Madagascar, islas de la Ascensión y Reunión, E de Asia y Japón. En la Península Ibérica, subespontáneo. **Esp:** [B] [Ge] [Po].

3. *P. vittata* L., Sp. Pl.: 1074 (1753)

[vittáta]

P. ensifolia Poir. in Lam., Encycl. 5: 711 (1804)

Ind. loc.: "Habitat in China"

lc.: Lám. 21

Rizoma robusto, rastrero, con páleas linear-lanceoladas amarillentas. Frondes de hasta 130 cm; pecíolo de hasta 15 cm, mucho menor que la lámina; ésta, 1-pinnada, con 10-55 pares de pinnas subopuestas, que disminuyen progresivamente de tamaño hacia la base, enteras o serradas. Soros dispuestos en una línea submarginal, faltando en la porción distal de las pinnas; pseudoindusio subentero, escarioso. Esporas tetraédricas, con las caras planas, reticuladas. $2n = 58^*$, 116^* ; $n = 58^*$, 87^* .

Muros, taludes y grietas de rocas rezumantes, bordes de acequias y arroyos, así como pedregales húmedos. II-X. Regiones mediterránea y macaronésica y reinos paleotropical, capense y australiano. Andalucía, Mallorca y Levante, subespontáneo en Barcelona. **Esp.:** A Al [B] Ca Co Gr Ma PM[(Mil)] Se V.