

**1. Aristolochia**

5. Tallos generalmente ascendentes; hojas 2-6 × 2,8-8,5 cm, pubérulas; flores 3-6 cm ....  
 ..... **5. A. paucinervis**  
 – Tallos generalmente postrados; hojas 0,5-1,6 × 1,6-3 cm, glabras; flores 1-2,5 cm .....  
 ..... **6. A. bianorii**

**1. A. baetica** L., Sp. Pl.: 961 (1753)

[báetica]

*A. subglauca* Lam., Encycl. 1: 257 (1783)*Ind. loc.*: "Habitat in Hispania, Creta, arbores scandens"*lc.*: Font Quer, Pl. Medic.: 197 (1962)

Trepadora. Rizoma globoso-fusiforme. Tallos sufruticulosos; ramillas débiles, a veces filiformes, angulosas. Hojas pecioladas, ovadas o cordado-reniformes, enteras, agudas u obtusas, mucronuladas, a veces escotadas en el ápice, generalmente coriáceas y glaucas, más pálidas por el envés. Flores 2-7 cm, solitarias, claramente pedunculadas. Tubo generalmente curvado, pardo oscuro o morado; limbo agudo, mucronado, de pardo-purpúreo a negruzco. Pedúnculo y ovario glabros. Cápsula 2-6 cm, globoso-ovoidea, con septos muy finos en la base.

Matorrales, bosques, setos y espinares, a veces en zonas rocosas; piso basal. XII-VI. S de la Península Ibérica y N de África. Andalucía, Levante y el Algarve. **Esp.**: (A) Al Ca Co Gr H J Ma Mu Se. **Port.**: Ag. **N.v.**: aristoloquia bética, balsamina, candiles.

**2. A. clematitis** L., Sp. Pl.: 962 (1753)

[clematítis]

*Ind. loc.*: "Habitat in Gallia, Tataria"*lc.*: Font Quer, Pl. Medic.: 195 (1962)

Rizoma rastrero, ramoso. Tallos de hasta 50 cm, simples, débiles, erectos o ascendentes. Hojas 4-10 × 4-9,5 cm, glabras, pecioladas, cordado-deltaideas, enteras, obtusas, con un amplio seno y aurículas redondeadas en la base. Flores 1,8-3 cm, 2-5 fasciculadas, glabras exteriormente. Tubo ligeramente curvado; limbo de longitud igual o menor que la del tubo, ovado-lanceolado, agudo, verde-grisáceo, pálido exteriormente y pardusco por la cara interna. Ovario claviforme, glabro. Cápsula de ovoide a piriforme.  $2n = 14^*$ .

Matorrales ribereños y orillas de regatos, sobre suelos arcillosos o arenosos; piso basal. IV-VIII. Región eurosiberiana. NE de la Península y Baleares. **Esp.**: B Ge PM[Mil Mn]. **N.v., cat.**: clematítide, aristolòquia sarmentosa.

Antiguamente cultivada como medicinal en toda Europa.

**3. A. pistolochia** L., Sp. Pl.: 962 (1753)

[pistolóchia]

*Ind. loc.*: "Habitat in Hispania, G. Narbonensi"*lc.*: Font Quer, Pl. Medic.: 196 (1962)

Rizoma formado por numerosos tubérculos cilíndricos, fasciculados. Tallos numerosos, flexuosos, generalmente erectos o ascendentes, simples o ramificados. Hojas 1,2-4,5 × 1-3 cm, pecioladas, ovado-trianguulares, de agudas a emarginadas, cordadas en la base; margen cartilaginoso, ondulado o denticulado-