



Lugares temporalmente encharcados.
Todo el territorio.
Distribución general. W de la Región
Mediterránea.


2. *Chamaemelum fuscatum* (Brot.) Vasc.,
Anais Inst. Vinho Porto 20: 276 (1967)

Anthemis fuscata Brot., *Fl. Lusit.* 1: 394
(1804)

Maruta fuscata (Brot.) DC., *Prodr.* 6: 14
(1837)

Perideraea fuscata (Brot.) Webb, *Iter
Hisp.* 38 (1838)

Anuales, glabrescentes, generalmente rojizas en la mitad inferior. Tallos de 6-40 (-60) cm, erectos o ascendentes, generalmente ramificados en la mitad inferior. Hojas inferiores bi o tripinnatisectas; las superiores pinnatisectas, rara vez bipinnatisectas; lóbulos lineares, no mucronados. Pedúnculos de 1-7 cm, ensanchados en la parte superior. Involucro de 3-5 × 4-7 mm. Receptáculo ligeramente cónico o hemisférico. Brácteas involucrales con un margen escarioso ancho y generalmente rojizo, glabras; las externas ovadas, las medias e internas obovadas. Brácteas interseminales obovadas, generalmente del mismo color que las involucrales, rara vez hialinas, glabras. Capítulos radiados. Flores hemiliguladas neutras, o femeninas y generalmente estériles, con limbo de 4-14 mm, blanco con base amarilla, generalmente reflejas después de la antesis; las flosculosas amarillas, con tubo de 1-1,2 mm, con base decurrente por ambos lados del ovario, formando 2 gibas y limbo de 0,8-1,3 mm, campanulado. Aquenios de 1-1,4 mm, ovoideos, ligeramente comprimidos dorsiventralmente, con c. 30 costillas longitudinales y 3 costillas más prominentes en la cara ventral. $2n = 18$. Florece y fructifica de Octubre a Mayo.



Lugares abiertos, sobre suelos
generalmente ácidos. Pedroches,
Sierra Norte, Aracena, Andévalo,
Litoral, Campiña Baja gaditana,
Grazalema, Algeciras.
Distribución general. W de Europa,
NW de Africa, Macaronesia (Azores y
Madera); naturalizado en muchos
países del S de Europa.

3. *Chamaemelum nobile* (L.) All., *Fl. Pedem.*
1: 185 (1785)

Anthemis nobilis L., *Sp. Pl.* 894 (1753)

Ormenis nobilis (L.) J. Gay in Cosson &
Germ., *Fl. Descr. Anal. Par.* 2: 397
(1845)

O. nobilis var. *discoidea* Boiss. ex Willk.
in Willk. & Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* 2:
98 (1865)

Perennes, rizomatosas, vilosas. Tallos de 6-40 cm, erectos o ascendentes, simples o ramificados. Hojas inferiores y medias generalmente bipinnadas; las superiores unipinnadas; lóbulos lineares. Pedúnculos de 0,5-1,1 cm, no engrosados en la parte superior. Capítulos solitarios. Involucro de 4-5 × 7-9 mm. Brácteas involucrales obovadas con un margen hialino ancho. Receptáculo ligeramente cónico. Brácteas interseminales obovadas, semejantes a las involucrales, ligeramente vilosas. Capítulos radiados o discoideos. Flores hemiliguladas generalmente fértiles, con limbo de 4-11 mm,

