




Lugares húmedos y sombríos. Poco frecuente. Litoral gaditano, Campiña Baja gaditana, Grazalema, Algeciras. *Distribución general.* Región Mediterránea.

**5. *Oenanthe pimpinelloides* L., *Sp. Pl.* 255 (1753)**

Tubérculos ovoideos. Tallos de hasta 80 cm, macizos, estriados. Hojas basales (1-)2 pinnatisectas, con segmentos de último orden ovados y lobados; las caulinares pinnatisectas, con segmentos lineares. Umbela central con 4-12 radios y sin brácteas. Umbela de segundo orden con numerosas bracteolas subuladas. Dientes del cáliz de 0,6-1,5 mm. Frutos de 3,7-4,5 × 1-1,5 mm, oblongoideos, con un anillo calloso basal, al menos algunos pedicelados. Estilos de 2-2,6 mm.  $2n = 22$  (Cádiz). *Florece de Mayo a Julio.*



**16. *Foeniculum* Miller, *Gard. Dict.*, *Abr. ed.* 4 (1754) (\*)**

Hierbas perennes. Hojas 3-4 pinnatisectas. Inflorescencias sin brácteas ni bracteolas. Dientes del cáliz ausentes. Pétalos amarillos. Frutos de ovoideos a oblongoideos, con costillas primarias bien marcadas, las marginales más desarrolladas, con 1 vitta por valécula y 2 vitta comisurales. Endospermo sinuado.



Bordes de cultivos y cunetas. Todo el territorio. *Distribución general.* W y C de Europa, Región Mediterránea, SW de África, Macaronesia.


**1. *Foeniculum vulgare* Miller, *Gard. Dic.*, ed 8, n. 1 (1768)**

subsp. ***piperitum*** (Ucria) Coutinho, *Fl. Port.* 450 (1913)

*Anethum piperitum* Ucria in Roemer, *Arch. Bot.* 1: 68 (1796)

*Foeniculum piperitum* (Ucria) Sweet, *Hort. Brit.* (1826)

Tallos de hasta 275 cm. Hojas basales 3-4 pinnatisectas, con lóbulos terminales filiformes, acuminados; las caulinares 3 (-4) pinnatisectas o frecuentemente reducidas a la vaina. Umbelas con 3-11 radios terminales a menudo sobrepasadas por las laterales. Frutos de 5-10 mm.  $2n = 22$  (Cádiz). *Florece de (Mayo) Junio a Septiembre.*



(\*) Por F. García Martín