

- 23 bis. *Asplenium fontanum* Bernh. (1799).
Rochers des Hautes montagnes. — M. Haut Atlas Oriental.
— Massif du Rhat, du M'Goun et de l'Aïoui 2 600-3 500 m
(Q. 1951. — Rauh 1951. — Q. et S. 1953).
38. *Pteris longifolia* L.
ajouter : O. Ravin du J. Lindles près des Andalouses (D. et
S. 1951).
42. *Marsilea strigosa* Will. var. *pubescens* (Ten.) Maire et Weiller.
ajouter : O. Mares de Tesselent près de Tiaret (Ch. et Q.
1953).
45. *Pilularia minuta* Dur.
ajouter : O. Mares de M'Sabia (D. Q. et S. 1951).
48. *Isoetes Duriaei* Bory.
ajouter : A. Forêt de Sidi Bernous et du J. Bissa près de
Ténès (Q. 1954), Tamgout d'Azazga (D. et F. 1957).
- 59 bis. *Juniperus Sabina* L.
ajouter : M. Rif, environs de Chechaouen.
61. *Cupressus Dupreziana* A. Camus = *G. Lereddei* Gaussen.
Au sujet de cette espèce au Hoggar cf. QUÉZEL, Bull. Soc. Hist.
Nat Af. du Nord, 1954, p. 55, et au Tassili des Ajjer, cf. LEREDDE,
Etude écologique et phytogéographique du Tassili N'Ajjer ; Inst.
Rech. Sahariennes, Alger, 1957, p. 260.
68. *Ephedra alata* Dec.
ajouter le ssp. *Monjauzeana* DUBUIS et FAUREL, Bull. Soc.
Hist. Nat. Af. du Nord, 1957, p. 475.
Description : Arbuste de petite taille, 50-75 cm et plus rarement
1 m, rappelant le type de l'espèce : ssp. *Decaisnei* (Stapf) Maire.
Châtons mâles analogues à ceux du type par la forme des bractées
atténuées en coin dans leur moitié inférieure, mais fleurs très dis-
tinctes aussi bien du type que de la ssp. *alenda* (Stapf) Trabut par la
présence de 2 colonnes staminales individualisées dès l'insertion et
portant chacune 4 anthères sessiles. Galbules gros, 10-15 mm à matu-
rité, de la taille de ceux de la ssp. *alenda*, mais à bractées atténuées en
coin à la base comme dans le type ; 2 graines assez grandes, 9-10 mm
de longueur, trigones, munies au sommet de trois dents terminales
dont la dorsale un peu plus courte ; tubille persistant, droit dépassant
un peu les dents latérales.