

2. *Phyllitis*2. *Phyllitis* Hill *

[*Phyllitis* f. – gr. *phyllitis* = lengua cervina. Alude, según Dioscórides, a que la planta no produce ni tallo, ni flor, ni fruto, sino solo hojas (gr. *phýllon*)

Rizoma revestido de páleas lanceolado-acuminadas, tenuemente clatradas. Frondes fasciculadas; pecíolo paleáceo; lámina entera o subentera, con nervadura abierta. Soros de oblongos a lineares, dispuestos por pares, los de dos venas vecinas paralelos y confluentes, semejando un soro único; indusios lineares, cada uno inserto en la parte externa del cenosoro, semejando un indusio bivalvo. Esporas ovoideas, con perisporio reticulado y verrucoso.

1. Lámina oblongo-lanceolada, cordada en la base, con aurículas redondeadas no divaricadas; pecíolo en general mucho más corto que la lámina **1. Ph. scolopendrium**
- Lámina de las frondes adultas hastada, con aurículas generalmente agudas y divaricadas; pecíolo subigual o mayor que la lámina **2. Ph. sagittata**

1. Ph. scolopendrium (L.) Newman, Hist. Brit.

[Scolopéndrium]

Ferns ed. 2: 10 (1844)

subsp. **scolopendrium***Asplenium scolopendrium* L., Sp. Pl.: 1079 (1753) [basión.]*Scolopendrium vulgare* Sm. in Mém. Acad. Roy. Sci. (Turín) 5: 421, Expl. Tab. (1793)*S. officinale* DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 2: 552 (1805), nom. illeg.*Ind. loc.*: "Habitat in Europae umbrosis, nemorosis, saxosis"*lc.*: A. Fern. & R. Fern. (eds.), Icon. Selecta Fl. Azoricae 1, tab. 20 (1980)

Rizoma alargado, densamente revestido de páleas de color castaño. Frondes (10)20-50(60) cm, persistentes; pecíolo de subigual a 1/3 de la lámina, verde, al fin castaño purpúreo; lámina (5)10-40(50) × 3-7 cm, oblongo-lanceolada, cordada y con aurículas redondeadas no divaricadas en la base, aguda u obtusa en el ápice, de margen entero, ligeramente ondulado, paleácea en el envés, sobre todo en el raquis; nervios bifurcados en su mayoría en la proximidad de la base, un poco dilatados en el ápice. Soros de hasta 3 cm, lineares, desiguales; indusio de margen entero. Esporas (24)27-30(33) μm de diámetro, ovoideas, castaño-claras, con perisporio laxamente reticulado, verrucoso. $2n = 72^*$; $n = 36^*$.

Bosques, muros y roquedos umbrosos y húmedos; 0-2000 m. I-XI. Europa, región mediterránea, Azores y Madeira. Frecuente en el N de la Península, más raro y sólo en los sistemas montañosos hacia el S y en Mallorca. (**And.**) **Esp.**: A Ab Al B (Ba) Bi Bu C Ca Cc Co? Cs Ge Gr Gu Hu J (L) Le Lo Lu M Ma Na O Or PM[Mil] Po S Sa Se Sg SS T (Te) V (Vi) Z. **Port.**: AAl BA BL DL E Mi R. **N.v.**: lengua de ciervo, lengua cervina, escolopendra, yerba cervuna, hierba de la sangre; *port.*: língua-cervina, língua-de-veado, língua-de-vaca, broeira; *cat.*: llengua de cérvol vera, herba melsera, melsera, llengua de cervo; *eusk.*: orein-mihia, zakurmi, epai-bedar; *gall.*: cervoa, cerviña, lengua de cervo, herba dos escaldados.

* J. Ormonde