

1. *Asplenium*

17. Lámina oblongo-lanceolada; pínulas anchamente atenuadas en la base, con dientes divergentes ..... **8. A. foreziense**  
 – Lámina ovado-lanceolada u oblongo-lanceolada; pínulas largamente atenuadas en la base, con los dientes no divergentes ..... **9. A. billotii**

1. **A. hemionitis** L., Sp. Pl.: 1078 (1753) [Hemionítis]

*A. palmatum* Lam., Encycl. 2: 302 (1786)

*Ind. loc.*: "Habitat in Italia, Hispania" [indicaciones erróneas]

*lc.*: A. Fern. & R. Fern. (eds.), Icon. Selecta Fl. Azoricae 1, tab. 18 (1980)

Rizoma grueso, oblicuo, densamente cubierto de páleas ovado-lanceoladas, cordadas, acuminadas, oscuras. Frondes de hasta 35 cm; pecíolo 2,5-25 cm; lámina de hasta 18 × 16 cm, generalmente algo menor que el pecíolo, palmeada, 3-5(7) lobada o subentera en las frondes jóvenes, cordada en la base, coriácea, verde brillante, glabra; lóbulos con margen entero, en general acuminados y agudos, a veces obtusos o subcaudados, el central mayor que los laterales; nervios muy numerosos, paralelos entre sí, repetidamente bifurcados. Soros lineares, a lo largo de la parte terminal de los nervios; indusio membranáceo, rígido, estrecho, entero. Esporas ovoides, con perisporio verrucoso.  $2n = 72$ .

Roquedos húmedos o pedregales basálticos, en lugares ± umbrosos. VI. Macaronesia, N de África y Portugal (Serra de Sintra, Mafra). **Port.**: E. **N.v.**, *port.*: feto-de-folha-de-hera.

2. **A. marinum** L., Sp. Pl.: 1081 (1753) [marínium]

*Ind. loc.*: "Habitat in Anglia, insulis Stoechadum"

*lc.*: Salvo, Fl. Pterid. Andalucía: 298 figs. A-B (1982)

Rizoma oblicuo, cubierto de páleas linear-lanceoladas, con ápice filiforme, de castaño-claras a castaño-oscuros. Frondes de hasta 58 cm, en fascículos laxos; pecíolo generalmente menor que la lámina, de castaño rojizo a castaño negruzco; raquis castaño rojizo, verdoso en el ápice; lámina 8-37 × 2-8 cm, 1-pinnada, oblongo-lanceolada, coriácea, raramente membranácea; pinnas 1,25-3,5 × 0,7-1,5 cm, hasta 40 a cada lado del raquis, cortamente pecioluladas, sésiles o decurrentes, ovadas, subromboidales u oblongas, obtusas y asimétricas en la base, con margen crenado, dentado o serrado; nervios 2-4 veces bifurcados. Soros (2)6-12(18) por pinna, oblongos, anchos, generalmente no confluentes. Esporas (23)27-32(38) μm de diámetro, ovoideas, generalmente con perisporio crestado, con crestas poco elevadas, reticulado-verrucoso en las aréolas.  $2n = 72^*$ ;  $n = 36^*$ .

Acantilados marítimos protegidos del oleaje, tanto calizos como silíceos; rara vez en el interior. III-XI. Litoral atlántico europeo, mediterráneo occidental y macaronésico. Cataluña, Baleares, Valencia, Cádiz y desde el Cabo de San Vicente hasta el Golfo de Vizcaya. **Esp.**: Bi C Ca Ge Lu O PM[Mll Mn] Po S SS V. **Port.**: Ag BAl BL DL E Mi. **N.v.**, *cat.*: falzia marina.

3. **A. petrarchae** (Guérin) DC. in Lam. & DC., [Petrárchae]  
Fl. Franç. ed. 3, 5: 238 (1815)

*Polypodium petrarchae* Guérin, Descr. Fontaine Vaucluse 1: 124 (1804) [basión.]

*A. glandulosum* Loisel., Not. Fl. France: 145 (1810), nom. illeg.

*Ind. loc.*: "Habitat in speluncis vallis-clausae" [dep. Vaucluse, en Francia]

*lc.*: Salvo, Fl. Pterid. Andalucía: 316 figs. A-C (1982)