

1. *Selaginella*

Tallos 3-15 cm; ramas ascendentes, de simetría radiada. Microfilos 1-3 mm, lanceolado-acuminados, espinuloso-ciliados, con 2-10 dientes, sin nervadura aparente. Estróbilos de hasta 3,5 cm, solitarios y terminales. Esporofilos similares a los microfilos, pero de mayor tamaño. Micrósporas de color amarillento.  $2n = 18^*$ ;  $n = 9^*$ .

Turberas, pastos húmedos y repisas umbrosas de roquedos; 1200-2500 m. VI-IX. Circum-boreal, zonas árticas y montañas de las regiones templadas de Europa, Asia y N de América; Macaronesia (Hierro ?). Pirineos y Cordillera Cantábrica. **And. Esp.:** B Bu Ge Hu L Le Na O P S. **N.v., cat.:** selaginella de muntanya.

2. *S. denticulata* (L.) Spring in Flora [denticuláta]  
(Regensburg) 21: 149 (1838)

*Lycopodium denticulatum* L., Sp. Pl.: 1106 (1753) [basión.]

*Ind. loc.:* "Habitat in Lusitania, Hispania, Iberia"

*Ic.:* Lám. 6

Tallos de hasta 15(20) cm, postrado-radicantes, de simetría dorsiventral. Microfilos  $\pm$  imbricados, sin nervadura aparente; los inferiores, 1,5-3 mm, patentes, ovado-apiculados, hialino-denticulados; los superiores, de hasta 2 mm, ovados, largamente apiculados, adpresos. Estróbilos de hasta 3 cm, a veces ramificados, sésiles, terminales. Esporofilos algo mayores que los microfilos superiores, ovado-lanceolados, largamente apiculados. Megaspangios numerosos; microspangios con micrósporas anaranjadas.  $2n = 18^*$ ;  $n = 9^*$ .

Taludes térreos, grietas y en general en lugares umbrosos con rocío frecuente; 0-1000 m. XII-VI. Región mediterránea, Canarias y Madeira. Baleares, litoral mediterráneo, mitad S de la Península y Portugal. **Esp.:** A Al Av B Ba Ca Cc Co CR Cs Ge Gr H J (M) Ma (Mu) PM Se T To V. **Port.:** todas las provincias excepto Mi. **N.v.:** pinchúita, selaginela; *port.:* selaginela; *cat.:* selaginella denticulada.

Según algunos, la tisana de esta planta es antihelmíntica.

3. *S. kraussiana* (Kunze) A. Braun, Index Sem. [Kraussiána]  
Hort. Berol. 1859: 22 (1860)

*Lycopodium kraussianum* Kunze in Linnaea 18: 114 (1844) [basión.]

*Ind. loc.:* "In sylvis Zitzikamma districtus Uitemhage in terra detexit Kraus [sic] Martio 1839" [Sudáfrica]

*Ic.:* A. Fern. & R. Fern. (eds.), Icon. Selecta Fl. Azoricae 1. tab. 3 (1980)

Tallos de hasta 1 m, articulados en los puntos de ramificación, de simetría dorsiventral. Microfilos inferiores 3-4 mm, oblongo-lanceolados, agudos, hialino-denticulados, patentes, con nervio central distinguible; los superiores, 1,5-2,5 mm, ovado-lanceolados, hialino-denticulados, adpresos. Estróbilos de hasta 2 cm, sésiles, dispuestos lateralmente en ramillas terminales. Esporofilos menores que los microfilos, ovado-caudados, conduplicados. Megaspangios 1-2; microspangios numerosos, con micrósporas amarillentas.  $2n = 20^*$ .

Lugares frescos y umbrosos; subespontáneo, escapado de parques y jardines. III-IX. África tropical y austral; naturalizada en Macaronesia y Europa occidental. **Esp.:** [B] [S] [SS] [Te]. **Port.:** [BA] [BL] [DL] [E] [Mi].