

5. *Juniperus*

monoico; copa cónico-fastigiada. Hojas juveniles 5-14 × 0,5-1 mm, por lo general ternadas, agudas y mucronadas; hojas adultas 0,7-1 mm, ovado-romboidales, densamente imbricadas, obtusas o agudas, con margen estrecho escarioso. Gárbulo 8-14 mm, globoso u ovoideo, madurando a los 2 años, finalmente rojo oscuro. Semillas 3-9.

Regiones mediterránea y macaronésica. **N.v.:** sabina roma, sabina suave, sabina negral, sabina negra, sabina pudia, cedro de España; **port.:** sabina-da-praia, zimbreira, zimb-ro-das-areias; **cat.:** savina; **usk.:** miter feniziarrá, sabina feniziarrá.

1. Ápice de las ramas escasamente caudado; gárbulo 8-10 mm ..... **a.** subsp. **phoenicea**  
 – Ápice de las ramas netamente caudado; gárbulo 12-14 mm ..... **b.** subsp. **turbinata**

**a.** subsp. **phoenicea**

Ramas con ápice que no excede mucho las ramillas laterales inmediatas. Hojas escuamiformes obtusas o subagudas. Gárbulo 8-10 mm, globoso, raramente elipsoidal.

Matorrales xerofíticos, crestones y grietas de roca; 0-1400(1800) m. II-III. La misma área que la especie. Frecuente en la Península, excluyendo el N y NW. **And. Esp.:** A Ab Al B Bu Ca Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Lo Ma Mu Na P PM S So T Te V Vi Z. **Port.:** Ag BAl BL E.

- b.** subsp. **turbinata** (Guss.) Nyman, Consp. [turbináta]  
 Fl. Eur.: 676 (1881)

*J. turbinata* Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 634 (1844) [basión.]

*J. oophora* Kunze in Flora (Regensburg) 29: 637 (1846)

*J. phoenicea* subsp. *lycia* auct.

*Ind. loc.:* "In arenosis, vel rupestribus maritimis; Montallegro; Secciaira (Gasparr.)"

*Ic.:* Laguna, Fl. Forest. Españ., Atlas, lám. 14 figs. 2-3 (1884)

Ápice de las ramas muy prolongado, excediendo ampliamente las ramillas laterales inmediatas. Hojas escuamiformes agudas. Gárbulo 12-14 mm, ovoideo.

Arenas y dunas litorales. II. Mediterráneo occidental (desde el S de Francia y Sicilia hasta Marruecos). S y E de la Península, Baleares. **Esp.:** Al Ca H Ma PM T V.

- 5. J. thurifera** L., Sp. Pl.: 1039 (1753) [thuríferá]

*Ind. loc.:* "Habitat in Hispania"

*Ic.:* Laguna, Fl. Forest. Españ., Atlas, lám. 13 fig. 2 (1884); Ruiz Torre & Ceballos, Arb. España Penins.: 134 lám. 19 (1971)

Árbol de hasta 20 m, dioico, con dimorfismo sexual. Ramas ± patentes, formando una copa piramidal. Hojas todas decusadas, las juveniles 3-6 mm, aciculares, las adultas 1,5-2 mm, imbricadas pero libres en el ápice, ovado-acuminadas o agudas, sin margen escarioso. Gárbulo 7-8 mm, subgloboso, madurando a los 2 años, pruinoso de joven y púrpura oscuro al madurar. Semillas 2-4.