

1. **Equisetum**

- 1. Estróbilos mucronados; estomas situados en depresiones profundas de la epidermis y alineados a cada lado de los valles 2
- Estróbilos obtusos; sin estomas o con estomas superficiales, alineados o dispersos en los valles 4
- 2. Costillas aplanadas; dientes de las vainas con un margen membranáceo ancho, blanquecino **1. E. variegatum**
- Costillas ± convexas; dientes de las vainas sin margen membranáceo blanquecino, o muy estrecho 3
- 3. Vainas del tallo principal cilíndricas, estrechamente aplicadas, de longitud igual o mayor que su anchura; dientes al fin truncados; tallos simples o ramificados accidentalmente (fig. 2) **2. E. hyemale**
- Vainas del tallo principal ensanchadas en la parte superior, de longitud sensiblemente mayor que su anchura; dientes ± agudos; tallos generalmente ramificados (fig. 3) **3. E. ramosissimum**
- 4. Vainas no aplicadas, netamente acampanadas 5
- Vainas aplicadas, no acampanadas 7
- 5. Dientes de las vainas soldados lateralmente formando 3 ó 4 lóbulos (figs. 4, 4') **4. E. sylvaticum**
- Dientes de las vainas libres o soldados lateralmente formando más de 4 lóbulos 6
- 6. Vainas con más de 14 dientes (fig. 5); estróbilos 4-10 cm **5. E. telmateia**
- Vainas con menos de 14 dientes; estróbilos menores de 4(4,5) cm **6. E. arvense**
- 7. Tallos no ramificados 8
- Tallos ramificados 9

