

### 33. *Achillea* L., *Sp. Pl.* 896 (1753) [*Gen. Pl.*, ed. 5: 382, 1754] (\*)

Hierbas perennes, caulescentes. Hojas de enteras a pinnatipartidas. Capítulos reunidos en un corimbo denso. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas involucrales externas más cortas que las internas, marcadamente aquilladas, con margen escarioso estrecho, coriáceas. Receptáculo cónico o plano, con brácteas interseminales de ovadas a panduradas. Capítulos radiados y heterógamos, con flores externas hemiliguladas femeninas e internas flosculosas y hermafroditas. Flores flosculosas con la base del tubo decurrente sobre el aquenio, cubriéndolo parcialmente en la madurez. Aquenios de oblongoideos a obovoideos, comprimidos, con 2 costillas laterales blanquecinas y con 1 costilla o sin costilla en la cara dorsal. Vilano ausente.

Hojas medias y superiores crenado-serradas. Planta de más de (20-) 50 cm, generalmente sin tallos estériles en la parte basal ..... **1. *ageratum***  
 Hojas medias y superiores pinnatipartidas o pinnatifidas. Planta de menos de 12 cm, con tallos estériles en la parte basal ..... **2. *odorata***



Preferentemente sobre suelos básicos y húmedos. Muy abundante. Todo el territorio.

*Distribución general.* W de la Región Mediterránea.

#### 1. *Achillea ageratum* L., *Sp. Pl.* 897 (1753)

Tallos de (20-) 50-90 cm, erectos, generalmente ramificados en la mitad superior, rara vez simples. Hojas subglabras, glanduloso-punteadas; las basales largamente pecioladas, ovadas, generalmente pinnatifidas; las medias y superiores subsentadas, elípticas, lanceoladas o linear-lanceoladas, crenado-serradas. Tallo principal hasta con c. 60 capítulos; ramas laterales con 8-20 capítulos. Involucro de 3-4,5 × 2,8-4 mm. Receptáculo largamente cónico en la fructificación. Flores hemiliguladas con limbo de 0,9-1,5 mm, amarillo-oro; las flosculosas de c. 2,5 mm. Aquenios de 1-1,5 mm. 2n = 18. *Florece y fructifica de (Mayo) Junio a Agosto (Septiembre).*




Pastizales sobre suelos calcáreos a más de 1000 m. Grazalema.

*Distribución general.* SW de la Región Mediterránea (Francia, España, Argelia y Marruecos).

#### 2. *Achillea odorata* L., *Syst. Nat.*, ed. 10, 2: 1225 (1759)

*A. microphylla* Willd., *Sp. Pl.* 3: 2210 (1803)

Tallos de 8-12 cm, simples, erectos o ligeramente ascendentes, con numerosos tallos estériles en la parte inferior. Hojas tomentosas, glanduloso-punteadas; las inferiores largamente pecioladas, bipinnatisectas; las medias y superiores de menos de 8 mm de anchura, pinnatisectas. Capítulos en grupos subcorimbosos de 25-30 capítulos. Involucro de c. 3 × 2-2,5 mm. Receptáculo ligeramente cónico. Flores hemiliguladas con limbo de 0,8-1 mm, amarillo-pálido; las flosculosas de c. 2 mm. 2n = 18. *Florece y fructifica de Junio a Julio.*



(\*) Por S. Talavera