

hemiliguladas blancas con la base amarilla. Las brácteas involucrales varían desde anchamente espatuladas a ligeramente espatuladas, que son las que predominan, hasta agudas, semejantes a las de *A. clavatus*. La articulación del tubo de las flores hemiliguladas con el ovario se presenta en todos los individuos incluso en las flores hemiliguladas totalmente blancas. Los aquenios, sobre todo los más externos, son morfológicamente más parecidos a los de *A. radiatus*, aunque presentan alas de hasta 0,8 mm, semejantes a las alas de *A. clavatus*.

**32. *Otanthus* Hoffmanns. & Link, *Fl. Port.* 2: 364 (1820-1834)**

*Diotis* Desf., *F. Atl.* 2: 260 (1799), non Schreber (1791)

Hierbas perennes, blanco-aracnoideas, caulescentes. Capítulos reunidos en inflorescencia corimbosa. Involucro con varias filas de brácteas. Receptáculo ligeramente cónico, con brácteas interseminales. Capítulos discoideos y homógamos, con flores flosculosas hermafroditas. Flores flosculosas con base desigualmente decurrente, cubriendo parcialmente al ovario. Aquenios con 3-4 costillas longitudinales. Vilano ausente.



Arenales marítimos. Litoral, Algeciras. *Distribución general.* Costas del Atlántico, desde Islandia hasta Canarias (Lanzarote y Gran Canaria), y del Mediterráneo.

**1. *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link, *Fl. Port.* 2: 365 (1820-1834)**


*Filago maritima* L., *Sp. Pl.* 927 (1753)

*Athanasia maritima* (L.) L., *Sp. Pl.*, ed. 2: 1182 (1763)

*Diotis candidissimus* Desf., *Fl. Atl.* 2: 261 (1799)

*D. maritima* (L.) Desf. ex Cass., *Dic. Sci. Nat.* 13: 296 (1819)

Rizomatosas. Tallos de 20-50 cm, ascendentes, leñosos en la base, con numerosas hojas. Hojas de hasta 13 x 6,5 mm, sentadas, oblongas u oblongo-lanceoladas, de crenuladas a ligeramente serradas, carnosas. Brácteas involucrales ovadas; las externas enteramente blanco-aracnoideas; las más internas subglabras en la mitad inferior. Flores de c. 4 mm, con tubo de c. 2,5 mm. Aquenios de 2,5-3 mm, trígonos o tetragonos, generalmente comprimidos por la cara dorsal. *2n* = 18 (Cádiz, Huelva), 36. *Florece y fructifica de Mayo a Septiembre.*



A. Carolin.

(\*) Por S. Talavera