

25. Ammi L., Sp. Pl. 243 (1753) [Gen. Pl., ed. 5: 113, 1754] (*)

Hierbas anuales. Hojas (1-) 2-3 pinnatisectas. Umbelas con numerosos radios y numerosas brácteas pinnatífidas y bracteolas ausentes. Dientes del cáliz apenas desarrollados. Pétalos enteros o ligeramente emarginados, los externos más largos que los internos, blancos. Frutos ovado-elipsoideos u oblongoideos, con costillas primarias prominentes; con 1 vitta por valécula y 2 vitas comisurales. Endospermo plano.

Hojas con más de 2 segmentos primarios saliendo de la base del limbo. Todas las hojas con segmentos de último orden lineares o filiformes, enteros. Radios más o menos convergentes en la fructificación **2. visnaga**
 Hojas con 2 segmentos primarios saliendo de la base del limbo. Hojas caulinares con segmentos de último orden lineares, dentados; las basales con segmentos de último orden obovados u oblanceolados, serrados. Radios divergentes en la fructificación **1. majus**



1. Ammi majus L., Sp. Pl. 243 (1753)

Tallos de 25-100 cm, estriados. Hojas basales 2-pinnatisectas, con lóbulos terminales obovados, rara vez oblanceolados, serrados; las caulinares (1-) 2 pinnatisectas, con lóbulos terminales lineares con dientes hialinos. Umbelas con 25-55 radios delgados, divergentes y frecuentemente endurecidos en la fructificación y numerosas brácteas trífidas o pinnatífidas, con margen escarioso. Umbelas de segundo orden con numerosas bracteolas lineares, con margen escarioso. Frutos de 1,5-2,7 × 0,7-1,3 mm. Estilos de 0,5-0,6 mm. 2n = 22 (Sevilla). *Florece de Abril a Mayo; fructifica de Junio a Julio.*



Ruderal y arvense. Frecuente. Sierra Norte, Condado-Aljarafe, Vega, Alcores, Litoral, Campiña Alta, Subbética, Grazalema, Algeciras.
Distribución general. Región Mediterránea.

2. Ammi visnaga (L.) Lam., Fl. Fr. 3: 462 (1778)

Daucus visnaga L., Sp. Pl. 242 (1753)

Tallos de 45-100 cm. Hojas basales (1-) 2 pinnatisectas, con más de 2 segmentos primarios saliendo de la base del limbo; lóbulos terminales lineares o filiformes; las caulinares 2-3 pinnatisectas. Umbelas con (30-) 45-125 (-150) radios glabros, más o menos convergentes en la fructificación y numerosas brácteas pinnatífidas, frecuentemente tan largas o más largas que los radios. Umbelas de segundo orden con numerosas bracteolas de subuladas a linear-subuladas. Frutos de 1,6-2,4 × (1-) 1,2-1,4 mm. Estilos de 0,6-1 mm. 2n = 20, 22. *Florece de Mayo a Junio; fructifica de Junio a Julio.*



Muy frecuente como ruderal. Todo el territorio.
Distribución general. Regiones Mediterránea y Macaronésica.

(*) Por F. García Martín