

9. *Anthriscus*2. *A. cerefolium* (L.) Hoffm., Gen. Pl. Umbell.: 41 (1814) [Cerefólium]

Scandix cerefolium L., Sp. Pl.: 257 (1753) [basión.]

Ind. loc.: "Habitat in apris & arvis Europae australioris" [lectótipo designado por K. Spalik & C.E. Jarvis in Taxon 38: 288 (1989): LINN 364.4]

lc.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21, tab. 2028 (1866); Font Quer, Pl. Medic.: 481 (1962); H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 2: 837 (1970) [sub *Chaerophyllum cerefolium*]; O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 402 (1990)

Hierba anual. Tallos 60-80 cm, erectos, fistulosos, hispídeos o \pm pubéculos. Hojas basales 7-15 \times 3-10 cm, de contorno triangular, 3 pinnatisectas, con las divisiones de último orden ovado-trianguulares, dentadas o pinnatisectas, con pelos dispersos, patentes en los nervios del envés. Umbelas con pedúnculos de 0-30(50) cm, con 2-4 radios, subiguales, de 10-35 mm, terminales –y a veces laterales–. Umbélulas con 4-6 flores hermafroditas, radios 3-10, de 2-7 mm, subiguales, engrosados en la fructificación, glabros, sin anillo apical de pelos. Bractéolas 2-3(4), de 1,5-4 mm, lineares. Pétalos c. 1 mm, blancos, oblongo-ovados. Frutos (7)8-10 \times 1-1,5 mm, \pm lineares, con pico aparente, de 2-4 mm, glabros o con pelos rígidos antrorsos. $2n = 18^*$.

Matorrales abiertos nitrófilos, bordes de camino, cultivado y ampliamente naturalizado fuera del territorio que abarca esta flora; c. 600 m. IV-VII. W, S y C de Europa, NW de África, Libia, SW de Asia (Cáucaso, N y NW de Irán, Khorassan, N de Iraq, Transcaspia). Naturalizado puntualmente en la Península. **Esp.**: [Ab] [T] [Z]. **N.v.**: cerefolio, perifolio, perifollo, perifollos, salsa de pastor; **port.**: cerefolho, cerefolho-das-hortas; **cat.**: cerepoll, cerfull ver, cerfull, cerpull, sarfull; **eusk.**: apo-perrexila, perraizta, perraizta.

Aromática y condimentaria. Como medicinal (diurética, aperitiva, tónica y estimulante) cayó en desuso.

3. *A. caucalis* M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 230 (1808) [Cáucalis]

Scandix anthriscus L., Sp. Pl.: 257 (1753) [syn. subst.]

A. vulgaris Pers., Syn. Pl. 1: 320 (1805), nom. illeg., non Bernh., Syst. Verz.: 168 (1800)

Ind. loc.: "Habitat in Europae aggeribus terrenis" [lectótipo designado por K. Spalik & C.E. Jarvis in Taxon 38: 288 (1989): LINN 364.5]

lc.: Tutin, Umbell. Brit. Isles: 55 (1980); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21, tab. 2029 figs. I, II y 1-5 (1866); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 295 (1987)

Hierba anual. Tallos 15-80(100) cm, ascendentes o erectos, de ordinario profusamente ramificados, fistulosos, glabros, ligeramente asurcados. Hojas 6-15 \times 3,5-10 cm, de contorno anchamente triangular, 3 pinnatisectas, con las divisiones de último orden de 5-15 \times 3-10 mm, ovadas, \pm profundamente lobadas, cubiertas de pelos largos, rígidos, patentes en el envés, pecíolos largos, que igualan la longitud del limbo, inflados, vilosos hacia la base. Umbelas insertas en pedúnculos cortos, opuestos a las hojas, con 2-5(6) radios de (10)15-25 mm, lisos. Umbélulas con (2)4-7 flores, todas hermafroditas, radios 2-10 mm, engrosados en la fructificación, con un anillo de pelos rígidos, blancos, junto a la inserción del fruto. Bractéolas 2-5, de 2-3 mm, ovado-lanceoladas, agudas o acuminadas, con margen ciliado estrecho. Pétalos de un verde amarillento o blancos, iguales, aparentemente escotados, con el ápice incurvado. Estilos muy cortos –hasta de 0,2 mm– en la fructificación. Frutos (3)4-5 \times 1,5 mm, ovoides, abruptamente contraídos en un