



Naturalizada en las arenas costeras.
Condado-Aljarafe, Litoral.
Distribución general. Originaria del S
de África, se encuentra naturalizada
en el W de Portugal y SW de España.

1. *Arctotheca calendula* (L.) Levyns, *Journ. S. Afr. Bot.* 8: 284 (1942)

Arctotis calendula L., *Sp. Pl.* 922 (1753)

Cryptostemma calendulacea (Hill) R.
Br. in W. Aiton & W. T. Aiton, *Hort. Kew.*, ed. 2, 5: 141 (1813)

Tallos frecuentemente decumbentes y ramificados en la base. Hojas largamente pecioladas, con limbo serrado, blanco-tomentosas por el envés; las basales generalmente ovadas; las caulinares con frecuencia liradas o pinnadas. Involucro de 10-13 × 16-20 mm. Flores hemiliguladas de 16-28 mm, verdosas, purpúreas o violadas en el dorso. Flores flosculosas de 3,3-4,3 mm, amarillo-doradas con la zona apical purpúrea o negra. Anteras de 1,8-2,4 mm. Aquenios de 2,4-2,5 mm, rugosos. Vilano con 7-8 escamas. $2n = 18$ (Huelva). *Florece de Marzo a Mayo (Junio).*

