

3. Bellis L., Sp. Pl. 886 (1753) [Gen. Pl., ed. 5: 378, 1754] (*)

Hierbas anuales o perennes, escaposas o caulescentes. Hojas alternas o en roseta basal. Capítulos solitarios. Involucro con 2-3 filas de brácteas subglabras o pubescentes. Receptáculo sin brácteas interseminales. Capítulos radiados y heterógamos, con flores externas hemiliguladas y femeninas, blancas, a veces teñidas de púrpura o azuladas, y flores internas flosculosas y hermafroditas, amarillas o ligeramente teñidas de púrpura. Aquenios obovoideos, comprimidos, con pericarpo coriáceo, más o menos pubescentes. Vilano formado por una corona de escamas desiguales o ausente.

- 1. Anual, caulescente. Involucro de 2-4 (-4,5) mm. Aquenios de 0,8-1,4 × 0,4-0,7 mm **1. annua**
- 1. Perenne, escaposa. Involucro de 4-13 mm. Aquenio de 1,2-2,3 × 0,6-1,3 mm . 2
- 2. Hojas con limbo cordado u orbicular-reniforme y pecíolo de (1-) 1,5-3 veces más largo que el limbo **4. rotundifolia**
- 2. Hojas con limbo oblongo, obovado o elíptico y pecíolo más corto o tan largo como el limbo 3
- 3. Flores flosculosas de 1,4-1,8 mm. Involucro de 3-6,5 mm **2. perennis**
- 3. Flores flosculosas de 2,2-3,5 mm. Involucro de (6-) 7-13 mm **3. sylvestris**

1. Bellis annua L., Sp. Pl. 887 (1753)

Anuales. Tallos de hasta 30 cm, erectos o ascendentes, simples o ramificados en la base, subglabros o pubescentes. Hojas de (3-) 6-40 × 1-15 mm; las caulinares oblongo-lanceoladas u obovado-espátuladas, enteras o dentado-crenadas, glabrescentes o hirsuto-pubescentes. Involucro de 2-4 (-4,5) mm. Brácteas involucrales glabras o con pelos pluricelulares laxamente dispuestos. Flores hemiliguladas de (2,6-) 3-7,8 mm, con tubo de 0,2-0,4 (-0,6) mm, blancas, a veces teñidas de púrpura o azuladas; las flosculosas de 0,9-1,5 (-1,7) mm. Aquenios de 0,8-1,1 × 0,4-0,7 mm, obovados, más o menos pubescentes. Vilano ausente.


Brácteas involucrales sin pelos o con pelos pluricelulares en el margen de tamaño muy diferente al de los del dorso **a. subsp. annua**
 Brácteas involucrales con pelos pluricelulares en el margen semejantes a los del dorso
 **b. subsp. microcephala**

a. subsp. annua

Subglabras o laxamente pubescentes. Hojas de 6-40 × 1-15 mm, dentado-crenadas. Involucro de 2-4 (-4,5) mm. Brácteas involucrales sin pelos pluricelulares marginales o con pelos diferentes a los dorsales en tamaño y número de células. Aquenios de 0,8-1,1 mm, con pelos cónicos o ligeramente clavados. 2n = 18. *Florece y fructifica de (Noviembre) Enero a Mayo.*



Prados y herbazales.
 Muy abundante. Todo el territorio.
Distribución general. Regiones
 Mediterránea y Macaronésica
 (Canarias).



-A. Ledeb.

(*) Por J. A. Devesa