



Suelos pedregosos calcáreos.  
Subbética cordobesa.  
*Distribución general.* S de España,  
NW de Africa. Distribución mal  
conocida. Indicada localmente en el  
S de Europa.



Muy abundante en todo el territorio.  
*Distribución general.* Europa, N de  
Africa, SW de Asia, Macaronesia  
(Azores, Madeira). Introducida en  
diversas partes del Globo.



Muy abundante en todo el territorio.  
*Distribución general.* Región  
Mediterránea.

b. subsp. **microcephala** (Lange) Nyman,  
*Consp.* 390 (1879)

*Bellis microcephala* Lange, *Vid. Meddel.  
Dansk Naturb. Foren. Kjøbenhavn*  
1860: 66 (1861)

Densamente pubescentes. Hojas de 3-26 ×  
1-9 mm, generalmente subenteras. Involu-  
cro de 2-3,5 (-4) mm. Brácteas involucrales  
con pelos pluricelulares marginales muy se-  
mejantes a las dorsales. Aquenio de (1,1-)  
1,3-1,4 mm, con pelos clavados. *Florece de  
Marzo a Mayo.*

2. **Bellis perennis** L., *Sp. Pl.* 886 (1753)

Perennes, a veces con un rizoma pequeño,  
escaposas, glabrescentes o laxamente pu-  
bescentes. Escapos de hasta 20 cm. Hojas  
de 10-60 × 4-20 mm, obovado-espuladas,  
crenadas o dentadas. Involucro de 4-6,5 mm.  
Brácteas involucrales con pelos pluricelu-  
lares más o menos abundantes en el dorso.  
Flores hemiliguladas de 5,7-8,3 mm, sobre-  
pasando el involucro en 2-5,2 mm, con  
tubo de 0,3-0,8 mm, blancas, a veces teñidas  
de púrpura; las flosculosas de 1,4-1,8 mm,  
amarillas. Aquenios de 1,2-1,6 × 0,6-0,9 mm,  
obovoideos, más o menos pubescentes. Vi-  
lano ausente. 2n = 18. *Florece y fructifica  
de (Octubre) Enero a Mayo (Junio).*

3. **Bellis sylvestris** Cyr., *Pl. Rar. Neap.* 2: 22  
(1792)

*B. perennis* subsp. *sylvestris* (Cyr.) Rouy,  
*Fl. Fr.* 8: 141 (1903)

Perennes, escaposas, subglabras o pubes-  
centes. Escapos de hasta 50 cm. Hojas de  
13-200 × 5-45 (-50) mm, con peciolo tan lar-  
go o más corto que el limbo, de oblongo-  
lanceoladas a obovado-espuladas, concol-  
loras. Involucro de (6-) 7-13 mm. Brácteas  
involucrales con pelos pluricelulares en el  
dorso. Flores hemiliguladas de (5,5-) 7,5-  
12 mm, sobrepasando el involucro en (1,7-)  
2-8 mm y con tubo de 0,7-1,5 mm, blancas  
o teñidas de púrpura; las flosculosas de 2-2,8  
(-3) mm. Aquenios de 1,3-1,8 × 0,6-1,2 mm,  
obovados, pubescentes, sobre todo en el  
margen. Vilano ausente o reducido a una  
pequeña corona de 0,2-0,7 mm, de escamas  
triangular-subuladas. *Florece y fructifica de  
Noviembre a Mayo (Junio).*

En Andalucía Occidental está representado por 2 va-  
riedades: la var. *sylvestris*, de hojas con limbo atenu-  
ado en un peciolo, muy abundante en todo el territo-  
rio; y la var. *pappulosa* (Boiss. ex DC.) Lange, *Vid.  
Meddel. Dansk Naturb. Foren. Kjøbenhavn* 1860: 66  
(1861) (*Bellis pappulosa* Boiss. ex DC., *Prodr.* 7: 276,  
1838), de hojas con limbo abruptamente contraído en  
un peciolo, muy común en Algeciras y, en menor me-  
dida, en Grazalema y Subbética. Entre ambas varieda-  
des existen numerosas formas intermedias.

