

2975. **Bupleurum Faurelii** Maire, n. sp. — Perenne, subcaespitosum ; herba tota glauca glabra. Caudex ramosus ramis apice foliorum vestigiis vestitus. Caules floriferi in rosula centrales ; folia rosulae nonnulla ramos breves steriles axillantia. Caulis teres, striatus, caeterum laevis, remote foliosus, usque ad 45 cm altus, superne plus minusve ramosus. Folia rosularum disticha conferta, plus minusve coriacea, linearia l. lineari-lanceolata, usque ad 8 cm \times 3^{mm}, erecto-patula l. recurva, plus minusve falcata, apice breviter acuminata acuta, basi plus minusve dilatata vaginantia, basi 6-nervia, superne 5-nervia, nervis lateralibus haud prominulis parum conspicuis, nervo medio subtus valde prominulo laevi, supra impresso, margine albido-callosa scabra. Folia caulina internodiis valde breviora, praeter inferius ramum fliferum axillantia, lanceolata l. ovato-lanceolata, usque ad 6 cm longa et 8^{mm} lata, basi lata plus minusve amplexicaulia, usque ad 15-nervia ; suprema bracteiformia. Umbellae longe pedunculatae 6-8-radiatae radiis inaequalibus tenuibus erecto-patulis, angulosis, laevibus, fere usque ad 2 cm. longis. Involucri phylla 5 parum inaequalia, lanceolata, basi 3-nervia, herbacea, acuta, usque ad 4 \times 1^{mm}. Umbellulae 4-8-florae. Pedicelli plus minusve angulati brevissimi, fructiferi parum elongati (vix ultra 0,7^{mm} longi), ovario valde breviores. Involucelli phylla 5, lanceolata, acuta, floribus breviora. Ovarium glauco-pruinose. Petala transverse elliptica, dilute flavovirentia, viridi nervata, in lobulum inflexum subquadratum retusum producta. Antherae flavae. Discus melleus, applanatus, integer, ovario latior. Styli erecti brevissimi. Diachaenia immaturum tantum suppetens ; mericarpia costis dorsalibus 3 parum prominulis praedita ; vittae intrajugales nullae ; vittae commissurales nullae ; vallecularae singulae parvae, saepe obsoletae.

Ab affinibus *B. montano* Coss. et *B. mesatlantico* Lit. et Maire distincta praesertim foliis caulinis versus basim conspicue dilatatis, saepius ovato-lanceolatis, vittis vallecularibus minimis, commissuralibus nullis.

Grand Atlas oriental : rochers calcaires de l'Akka-n-Ouyad, vers 2000 m (L. FAUREL).

2976. **Petroselinum crispum** (Miller) Nym. ex Auct. Kew. teste Airy-Shaw, Kew Bull., 1938, p. 257. — *P. hortense* Hoffm.

var. **gracillimum** Maire, n. var. — Folia etiam inferiora anguste laciniata ; umbellarum sub anthesi radii subfiliformes, fructiferi graciles ; diachaenia parva (c. 2^{mm} longa). Foliorum lacinae lineares l. lineari-lanceolatae, in infimis tantum latiores anguste cuneiformes.

Grand Atlas : Mont Tihallatin, Aït Maalla (IBRAHIM) ; Ari Ayachi (L. FAUREL).

Variété très voisine du var. *giganteum* (Pau) Maire, mais à lanières foliaires plus étroites et à rayons ombellaires plus grêles.