

47. **Bupleurum**

- Hojas de consistencia herbácea o coriácea; nervios apenas marcados –en algunos casos el central destacado–, los intramarginales, cuando existen, mucho más finos que el nervio central; hojas basales (2)5-18 cm ..... 9
- 9. Tallos herbáceos; planta cespitosa, con roseta de hojas basales persistentes durante la floración; brácteas y bractéolas siempre más anchas que las flores y frutos, bractéolas 2-8 mm de anchura ..... **9. B. ranunculoides**
- Tallos herbáceos o leñosos; planta no cespitosa, con hojas basales que se marchitan antes de la floración; brácteas y bractéolas de anchura similar o menor –a veces, ligeramente mayor– que la de las flores y frutos, bractéolas 0,2-1,5 mm de anchura ..... 10
- 10. Hojas de consistencia herbácea; las basales diferentes a las demás, con limbo oblongo-lanceolado u oblongo, bruscamente atenuado en pecíolo ± largo –hasta de 3/4 de la longitud total–; hojas caulinares linear-lanceoladas, sentadas, planas, a veces falcadas ..... **10. B. falcatum**
- Hojas de consistencia herbácea o coriácea; todas de linear-lanceoladas a oblongo-lanceoladas, no atenuadas o gradualmente atenuadas en la base; hojas caulinares de planas a involutas, muy raramente falcadas ..... 11
- 11. Tallos leñosos, muy ramosos; hojas de ordinario de consistencia coriácea, de lineares a oblongo-lanceoladas, en general recurvadas bruscamente en el ápice, de (0,5)1-10(14) cm; radios en ocasiones punzantes; frutos con pedicelos de 1-4(10) mm ..... **12. B. frutescens**
- Tallos ± herbáceos, poco ramosos; hojas de consistencia herbácea, o más raramente coriácea, de lineares a linear-lanceoladas, no recurvadas bruscamente en el ápice, de (1)5-18 cm; radios nunca punzantes; frutos con pedicelos de (2)3-10 mm ..... 12
- 12. Radios umbelares (3)5-12, ± rígidos; pétalos amarillos con banda o mancha media negruzca; frutos con costillas estrechamente aladas ..... **13. B. barceloi**
- Radios umbelares 3-9(14), flexibles; pétalos amarillos, sin banda media o con una de color castaño claro; frutos no alados (costillas filiformes) ..... **14. B. acutifolium**
- 13. Brácteas generalmente de mayor longitud que el mayor de los radios; bractéolas de ovadas a ovado-lanceoladas, erecto-conniventes, mucho más anchas que las flores y frutos; frutos lisos ..... **4. B. baldense**
- Brácteas de menor longitud que el mayor de los radios; bractéolas lineares o linear-lanceoladas, erectas o erecto-patentes, de anchura similar o menor que la de las flores y frutos; frutos lisos o papilosos ..... 14
- 14. Frutos ovoideos o globosos, papilosos, de 1-2,5 mm ..... 15
- Frutos de oblongos a oblongo-elípticos, lisos, de 2-6(7) mm ..... 16
- 15. Umbelas terminales y laterales, éstas frecuentemente sobre pedúnculos muy cortos; frutos con costillas bien marcadas, crenuladas ..... **7. B. tenuissimum**
- Umbelas terminales y laterales, sobre pedúnculos similares; frutos con costillas poco perceptibles ..... **8. B. semicompositum**
- 16. Umbelas con 1-4(6) radios; bractéolas generalmente más cortas que los frutos; frutos 4-6(7) mm ..... **5. B. praealtum**
- Umbelas con (1)3-8(10) radios; bractéolas de longitud normalmente mayor que la de los frutos; frutos 2-3,5 mm ..... **6. B. gerardi**

**1. B. rotundifolium** L., Sp. Pl.: 236 (1753)

[rotundifólium]

*Ind. loc.*: “Habitat inter Europae australis segetes” [lectótipo designado por S. Snogerup in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 162: 272 (1987); LINN 335.1]

*Ic.*: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 309 (1987); O. Boldòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 439 (1990); Snogerup & B. Snogerup in Willdenowia 31: 211 fig. 1 (2001); fig. 9 b