



Matorral bajo sobre areniscas ácidas.
Frecuente. Algeciras.
Distribución general. SW de España
(Provincia Gaditano-Onubo-
Algarviense, Sector Gaditano), NW de
Africa.

8. *Bupleurum foliosum* Salzm. ex DC., *Prodr.*
4: 133 (1830)

Arbustos. Tallos de hasta 100 cm. Hojas de lineares a linear-lanceoladas, frecuentemente revolutas, coriáceas, glaucas. Umbelas con (1-) 2-3 radios y 1-3 brácteas ovadas, mucronadas. Umbelas de segundo orden con 4-6 bracteolas ligeramente soldadas en la base. Frutos de 4-6 mm, oblongoideos, con costillas primarias prominentes, a veces muy estrechamente aladas, vitas no aparentes. Endospermo plano. $2n = 14$. *Florece de Julio a Agosto; fructifica de Septiembre a Noviembre.*



Frecuente en calizas, en lugares
sombrios. Subbética, Grazalema.
Distribución general. C y S de
España, NW de Africa.

9. *Bupleurum gibraltarium* Lam., *Encycl.*
Méth., Bot. 1: 520 (1785)

B. verticale Ortega ex Lange in Willk. &
Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* 3: 76 (1874)

Arbustos. Tallos de hasta 200 cm. Hojas sub-sentadas de hasta 25×3 cm, de oblongo-elípticas a ligeramente oblanceoladas, mucronadas, coriáceas, con 1 nervio ancho bien marcado y nervios laterales primarios no alcanzando el margen del limbo. Umbelas con 20-28 (-37) radios y (4-) 7-12 brácteas de ovadas a lanceoladas, reflejas, persistentes. Umbelas de segundo orden con 7-12 bracteolas. Frutos de (4,5-) 5,5-7 (-8) mm, con costillas primarias muy estrechamente aladas, con 1 vita por valécula y 2 vitas comisurales. Estilos de hasta 0,5 mm; estigma a veces sentado. Endospermo plano. $2n = 14$. *Florece de Julio a Agosto; fructifica de Septiembre a Noviembre.*

