

47. **Bupleurum**

más raro hacia el W, y Baleares. **Esp.:** A Ab Al Av B Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P PM[Ib] S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. **Port.:** AAl Ag BAi BL E R.

*Observaciones.*—Especie fácilmente reconocible por sus hojas, muy rígidas, con todos los nervios muy destacados, en particular los intramarginales.

1. Hojas basales atenuadas bruscamente en pecíolo, de 0,7-6,5 cm de anchura, limbo de obovado a oblongo-lanceolado o espatulado, con 5-13 nervios principales y numerosos nervios secundarios ..... **a. subsp. rigidum**
- Hojas basales sentadas, de 0,5-1,2 cm de anchura, generalmente lineares, raramente oblongo-lanceoladas, con 3-5 nervios principales, generalmente sin nervios secundarios ..... **b. subsp. paniculatum**

**a. subsp. rigidum**

*lc.:* H. Wolff in Engl., Pflanzentr. 43(IV.228): 153 (1910); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 311 (1987); fig. 10 b; lám. 73 a-e y g-l

Hojas basales atenuadas bruscamente en largo pecíolo, hasta de 2/3 de la longitud total, limbo 0,7-6,5 cm de anchura, obovado, oblongo-lanceolado o espatulado, con 5-13 nervios principales interconectados por numerosos nervios secundarios.

Bosques y matorrales mediterráneos, en todo tipo de substratos; 0-1500 m. (IV)VI-X(XI). Península Ibérica, S de Francia y N de Italia. Buena parte de la Península Ibérica, principalmente en la mitad E, más raro hacia el W, y Baleares. **Esp.:** A Ab Al B Bi Bu Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P PM[Ib] S Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za. **Port.:** AAl (E) R. **N.v.:** adelfilla, clujía basta, clujía fina, lengua de liebre, ontina, oreja de liebre; *cat.:* orella d'ase, orella de liebre.

**b. subsp. paniculatum** (Brot.) H. Wolff [paniculátum]  
in Engl., Pflanzentr.43(IV.228): 154 (1910)

*B. paniculatum* Brot., Fl. Lusit. 1: 454 (1804) [basión.]

*Ind. loc.:* "Hab. in collibus calcareis circa Conimbricam, et alibi in Beira et Extremadura"

*lc.:* Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 312 (1987); lám. 73 f

Hojas basales sentadas, con limbo no atenuado o atenuado gradualmente hacia la base, de 0,5-1,2 cm de anchura, lineares, raramente oblongo-lanceoladas, con 3-5 nervios principales, generalmente sin nervios secundarios.

Bosques y matorrales mediterráneos, en todo tipo de substratos; 0-1500 m. (IV)VI-X(XI). Península Ibérica y NW de África. Principalmente en el cuadrante SW de la Península Ibérica. **Esp.:** (Ab) Av Ca Cc (Co) CR (Gr) (J) Ma Sa Se To Za. **Port.:** AAl Ag BAi BL E R. **N.v.:** hierba dura, oreja de liebre.

**12. B. frutescens** Loefl. ex L., Cent. Pl. I: 9 (1755) [fruticéscens]

*Ind. loc.:* "Habitat in Hispaniae collibus altis"

Subarbusto, de (10)20-120 cm. Tallos leñosos, al menos en un tercio de su longitud, muy ramosos. Hojas todas similares, de (0,5)1-10(14) × 0,05-1 cm, de consistencia ± coriácea –muy raramente herbácea–, ± amplexicaules, de lineares a oblongo-lanceoladas, a veces subuladas, poco atenuadas hacia la base, agudas o