

47. *Bupleurum*

Hierba anual, de 10-70(85) cm. Tallos herbáceos, poco ramosos. Hojas basales diferentes de las caulinares, todas de consistencia herbácea, mucronadas, paralelinervias –con 6-30 nervios principales finos, conectados por tenues nervios secundarios–, sin nervio intramarginal; hojas basales 4-10 × 2-5 cm, amplexicaules, de oblongas a ovado-lanceoladas, gradualmente atenuadas en la base, marchitas antes de la floración; hojas caulinares 1-6 × 1-5 cm, perfoliadas, de ovadas a suborbiculares. Umbelas terminales y laterales, similares entre sí o las laterales menores, con (2)3-8(11) radios de 0,3-2 cm, subiguales, a veces desiguales, flexibles. Brácteas inexistentes. Bractéolas 4-5(6), de 5-15 × 2,5-7(14) mm, subiguales o desiguales, ovadas u ovado-lanceoladas, mucronadas, mucho más largas y anchas que las flores y frutos. Flores 5-15, con pétalos amarillos, generalmente sin banda media más oscura. Frutos con pedicelos cortos –de 1,5-2 mm–; mericarpos 2,5-4 × 1-1,5 mm, oblongos u oblongo-elípticos, lisos, con costillas filiformes, lisas; vitas imperceptibles. Semillas con endosperma cóncavo en la cara comisural.  $2n = 16^*$ .

Campos de cultivo, a menudo en las lindes, baldíos, en suelos relativamente secos, calizos o margosos; 0-2000 m. V-VII(VIII). W, C y S de Europa, NW de África (Argelia) y SW de Asia. Buena parte de la Península Ibérica, más raro hacia el W. **Esp.:** A Ab Al B Bu Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J (L) Le Lo (Lu) M Mu Na (Or) P (Po) S Sa Se Sg So T Te V Va Vi Z Za. **Port.:** Mi? **N.v.:** haloche, oreja de liebre, perfoliada; *cat.:* unflabou, unflabou rotundifoli; *eusk.:* langarika.

Sus hojas y raíces tiernas han sido usadas como verdura comestible.

*Observaciones.*—Próximo a *B. lancifolium*, de la que se diferencia por los frutos –y ovarios–, que son lisos y no tuberculados.

2. *B. lancifolium* Hornem., Enum. Pl. Hort.

[lancifólium]

Hafn. Suppl. 2: 3 (1809)

*B. subovatum* Link ex Spreng., Sp. Umbell.: 19 (1818)*B. protractum* Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 387 (1820-34)*B. lancifolium* subsp. *subovatum* (Link ex Spreng.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 2: 840 (1990)*Ind. loc.:* “Missum ex horto paris. sub nomina Bupl. d’Aegypte” [planta cultivada en Copenhague en 1804, a partir de semillas que se daban por provenientes de Egipto; lectótipo designado por S. Snogerup & B. Snogerup in *Wildenowia* 31: 217 (2001): C]*lc.:* Fiori & Paol., *Iconogr. Fl. Ital* ed. 3: 274 fig. 2232’ (1933) [sub *B. rotundifolium* var. *longifolium*]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), *Fl. Andalucía Occid.* 2: 309 (1987); Snogerup & B. Snogerup in *Willdenowia* 31: 218 fig. 4, 221 fig. 6 [sub *B. subovatum*] (2001); fig. 9 a

Hierba anual, de 6-75 cm. Tallos herbáceos, poco ramosos. Hojas basales diferentes de las caulinares, todas de consistencia herbácea, mucronadas, paralelinervias –con 6-30 nervios principales finos, conectados por tenues nervios secundarios–, sin nervio intramarginal; hojas basales 3-15 × 1,5-6 cm, amplexicaules, de oblongas a oblongo-lanceoladas, gradualmente atenuadas en la base, marchitas antes de la floración; hojas caulinares 1,5-6 × 1-3 cm, perfoliadas, de ovado-lanceoladas a ovadas. Umbelas terminales y laterales, similares entre sí o las laterales menores, con 2-3(4) radios de 0,5-3 cm, subiguales o desiguales, flexibles. Brácteas inexistentes. Bractéolas (4)5(6), de 2-16 × 3-15 mm, subiguales o desiguales, ovadas u ovado-lanceoladas, mucronadas, mucho más lar-