

27. *Prangos*1. *C. libanotis* L., Sp. Pl.: 246 (1753) [Libanótis]

Hippomarathrum bocconei Boiss. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 2: 74 (1844) ["bocconi"]

Ind. loc.: "Habitat in Sicilia, Monspelii"

lc.: Pignatti, Fl. Italia 2: 210 (1892); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 307 (1987); Arenas & García Martín in Ruizia 12: 102 fig 40 1, 104 fig. 41 2 (1993)

Hierba perenne, escábrida, de 25-120 cm. Hojas basales 3-6 pinnatisectas, con divisiones de último orden de $5-12 \times 1,5-2,5$ mm, de lineares a filiformes, rígidas, a menudo dentadas; hojas caulinares 2-4(5) pinnatisectas. Umbelas con 8-23 radios, \pm escábridos, al menos en la base. Brácteas de la umbela central 5-10, indivisas, bífidas o trifidas; las del resto de umbelas, indivisas y subuladas –raramente bífidas–. Bractéolas indivisas, de lineares a subuladas, raramente bífidas. Cáliz con dientes de menos de 0,5 mm. Estilopodio aplanado; estilos 1,5-2,5 mm en la fructificación, erecto-patentes. Frutos (4,5)6-11 \times 4,5-7 mm, ovoides; mericarpos con las costillas primarias prominentes, lisas –muy rara vez con papilas cortas y adpresas–. $2n = 22$.

Dunas y arenales, especialmente en las costas; 0-100 m. IV-VI. W de la región mediterránea. S de la Península Ibérica. **Esp.**: A Al Ca H Ma Mu. **Port.**: Ag (BAL).

2. *C. sicula* L., Sp. Pl. ed. 2: 355 (1762) [sícula]

Hippomarathrum pterochlaenum DC. ex Boiss. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 2: 74 (1844), nom. illeg.

Ind. loc.: "Habitat in Sicilia, Hispania"

lc.: Pignatti, Fl. Italia 2: 209 (1892); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 307 (1987); Arenas & García Martín in Ruizia 12: 102 fig 40 2, 104 fig. 41 1 (1993); lám. 42

Hierba perenne, algo escábrida, de 30-150 cm. Hojas basales 4-6 pinnatisectas, con divisiones de último orden de $15-50 \times 1-1,5$ mm, lineares, no rígidas, mucronadas. Hojas caulinares 3-5 pinnatisectas. Umbelas con (8)12-30 radios, \pm escábridos. Brácteas de la umbela central 4-7, (1)2 pinnatisectas, las del resto de umbelas indivisas, bífidas o pinnatisectas. Bractéolas subuladas, indivisas, bífidas o pinnatisectas. Cáliz con dientes de 0,7-1,1 mm. Estilopodio aplanado, ligeramente cóncavo; estilos 2,3-5 mm en la fructificación, recurvados. Frutos $12-17 \times 10-17$ mm, globosos –raramente elipsoides–; mericarpos con las costillas primarias prominentes, anchas y obtusas, papilosas o provistas de crestas dentadas. $2n = 22$; $n = 11$.

Subnitrófila, variara, en suelos básicos; 0-900 m. IV-VI. W de la región mediterránea. Mitad S de la Península Ibérica. **Esp.**: A (Al) Ba Ca Cc Co CR Gr H J Ma (Mu) Se To. **Port.**: AAl Ag BAL (BB) (E).

27. *Prangos* Lindl.*

[Prángos, -i f. – Según se lee en el protólogo, *Prangos* es el nombre que dan en "Draz" o "Imbal", en el norte de la India, a la *Prangos pabularia* Lindl. –seguramente se trata de la ciudad de Dras, en Cachemira (India)]

Hierbas perennes. Tallos muy ramificados, sin costillas, con un collar de restos fibrosos bien desarrollado. Hojas (3)4-7 pinnatisectas, glabras, con divisio-

* S.L. Jury