



En pastizales sobre arenales marítimos. Litoral, Condado-Aljarafe, Marisma, Algeciras.  
*Distribución general.* SW de España (Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense), W de Portugal, NW de Marruecos.


**7. *Carduus meonanthus* Hoffmanns. & Link,**  
*Fl. Port.* 2: 186 (1820-1834)

subsp. **meonanthus**

*C. ammophilus* Hoffmanns. & Link, l.c.  
 2: 187 (1820-1834)

*C. baeticus* Boiss. & Reuter, *Pugillus* 63  
 (1852)


Tallos de hasta 120 cm, simples o ramificados, glabrescentes o ligeramente aracnoideos. Hojas basales oblongo-lanceoladas, con (6-) 8-10 (-12) pares de lóbulos semipalmados, con espinas de hasta 5 mm; haz con pelos pluricelulares dispersos y envés con algunos pelos pluricelulares en el nervio medio y unicelulares en los internervios. Capítulos solitarios o en grupos compactos de (2-) 3-6 (-8), sentados o subsentados. Involucro de (15-) 17-22 × 4-10 mm, cilíndrico, marcadamente aracnoideo. Brácteas medias estrechamente lanceoladas, escuarrosas, estrechamente escariosas en la mitad inferior, con espina apical de hasta 3,5 mm. Flores con tubo de (4-) 5-8,5 mm y limbo de (5,5-) 6-8,5 mm. Aquenios de 3-4,2 × 1,3-1,8 mm, pardo-oscuros, con prominencia apical de 0,3-0,6 mm, subcilíndrica, ligeramente pentalobada. Vilano de 10-15 (-17) mm. 2n = 20 (Cádiz, Huelva, Sevilla). *Florece y fructifica de (Febrero) Marzo a Mayo.*



**8. *Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.,**  
*Prodr.* 6: 624 (1838)

*C. balansae* Boiss. & Reuter in Boiss.,  
*Diag. Pl. Or. Nov.*, ser 2, 3: 44 (1856)

Tallos de hasta 100 cm, simples o ramificados en la parte superior, subglabros o ligeramente aracnoideos. Hojas basales oblongo-lanceoladas, con 8-12 pares de lóbulos a su vez profundamente lobados y con espinas de hasta 4,5 mm; haz con pelos pluricelulares dispersos y envés aracnoideo con pelos pluricelulares en los nervios y unicelulares en los internervios. Capítulos solitarios o en grupos de 2-3, sentados o subsentados. Involucro de 15-20 × 6-11 mm, subovoideo, aracnoideo. Brácteas medias lanceoladas, atenuadas desde la base, erecto-patentes, con margen escarioso en el 1/3 inferior y espina apical de hasta 2 mm. Flores con tubo de (5-) 6-8 mm y limbo de 8-9,5 mm. Aquenios de 4,3-4,8 × 1,8-2,2 mm, amarillo-pajizos, con prominencia apical de 0,5-0,9 mm, globosa, ligeramente pentalobada. Vilano de 13,5-17 mm. 2n = 20 (Cádiz). *Florece y fructifica de Abril a Mayo (Junio).*



En pastizales sobre arenales marítimos. Litoral gaditano, Algeciras.  
*Distribución general.* S y SE de España, NW de Africa.