



Ruderal de suelos generalmente básicos. Muy frecuente. Todo el territorio.

Distribución general. C y S de Europa, N y NW de Africa, Macaronesia (Madera y Canarias).

a. subsp. lanatus

Generalmente tomentosas. Hojas involucrantes de 35-50 mm, erectas o erectopatentes, generalmente pinnatífidas. Involucro de 25-35 × 15-25 mm, generalmente aracnoideo. Vilano de 10-13 mm, generalmente blanquecino. $2n = 44$. *Florece y fructifica de Junio a Agosto.*



En matorrales y bordes de caminos, sobre suelos básicos. Subbética, Grazalema, Algeciras.

Distribución general. S de España, NW de Africa (Argelia, Marruecos).

b. subsp. baeticus (Boiss. & Reuter) Nyman, *Consp.* 419 (1879)

Kentrophyllum baeticum Boiss. & Reuter, *Pugillus* 65 (1852)

Carthamus lanatus var. *baeticus* (Boiss. & Reuter) Batt. in Batt. & Trabut, *Fl. Algér. (Dicot.)* 508 (1889)

Glabrescentes. Hojas involucrantes de 35-55 mm, arqueadas, generalmente de pinnatisectas a pinnadas. Involucro de 20-25 × (10-) 13-16 mm, generalmente glabrescente. Vilano de 8-10 mm, pardo-negruzco. $2n = 64$. *Florece y fructifica en Julio.*

