

61. Carum

- Umbelas con casi todos los radios de más de 2 cm; segmentos foliares con lóbulos agudos o subagudos, hasta de 1 mm de anchura; frutos de más de 2,2 mm; estilos 0,4-1 mm 2
- 2. Brácteas 5 o más; bractéolas 5 o más; radios de la umbela fructífera, por lo general, poco desiguales; limbo foliar c. 10 veces más largo que ancho, con segmentos filiformes que parecen verticilados **2. C. verticillatum**
- Brácteas 0-1(2); bractéolas, por lo general, inexistentes; radios de la umbela fructífera claramente desiguales; limbo foliar estrechamente ovado-triangular con segmentos pinnatisectos que terminan en lóbulos lineares o linear-lanceolados y sin aspecto verticilado **3. C. carvi**

1. C. foetidum (Coss. & Durieu ex Batt.) Drude [fóetidum]
in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(8): 192 (1898)

Selinopsis foetida Coss. & Durieu ex Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.): 348 (1889) [basión.]

Ind. loc.: "Plaines de Batna et de Lambèse"

Ic.: Lám. 92

Hierba perenne. Raíz napiforme, desnuda, de 7-15 cm. Cepa con restos de las hojas del año anterior pero que no forman collar fibroso. Tallos 30-60(120) cm, erectos, muy ramificados, estriados. Hojas basales 6-25 × 2-3 cm, con pecíolo largo –de hasta 3/4 la longitud total de la hoja–, segmentos pinnatisectos, con divisiones de último orden (lóbulos) divididas, por lo general, hasta menos de la mitad de su longitud y ápices obtusos, de 1,2-4 mm de anchura; hojas caulinares parecidas a las basales pero más cortas o reducidas a un lóbulo. Umbela con 3-6 radios de 0,5-1,5(2,1) cm, desiguales. Bráctea 0(1). Umbélulas con 6-10 radios de 0,1-0,3 cm. Bractéolas inexistentes. Flores c. 1 mm de diámetro. Cáliz sin dientes. Pétalos blanquecinos. Estilos 0,3-0,4 mm, más cortos o de igual longitud que el estilopodio en la fructificación. Frutos 1,5-2,1 mm, subglobosos.

Juncuales, prados halófilos y otros lugares de suelo húmedo y salino; 0-900(1100) m. VII-VIII. N de África y extremo SE de España. **Esp.**: A Gr Mu.

Observaciones.–Planta conocida de muy pocas localidades, en alguna de las cuales su supervivencia no está comprobada recientemente.

2. C. verticillatum (L.) W.D.J. Koch [verticillátum]
in Nova Acta Phys.-Med.Acad. Caes. Leop.-Carol.

Nat. Cur. 12(1): 122 (1824)

Sison verticillatum L., Sp. Pl.: 253 (1753) [basión.]

Ind. loc.: "Habitat in Gallia, Pyrenaeis"

Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 209 n.º 1597 (1902); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 319 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 1: 573 n.º 1085 (1997)

Hierba perenne. Raíz fasciculada, con fibras fusiformes gruesas. Cepa con collar de restos fibrosos. Tallos (30)40-90(120) cm, erectos, por lo general poco