

**73. *Lapsana* L., *Sp. Pl.* 811 (1753) [*Gen. Pl.*, ed. 5: 353, 1754] (\*)**

Hierbas anuales, caulescentes, con indumento glanduloso y eglanduloso en la base. Hojas alternas, divididas. Capítulos numerosos, solitarios. Involucro con 2 filas de brácteas. Brácteas involucrales externas escumiformes. Receptáculo plano, sin brácteas interseminales. Lígulas amarillas. Aquenios con c. 20 costillas longitudinales, sin pico. Vilano ausente.




Lugares húmedos de sotobosques, sobre suelo preferentemente ácido. Muy rara. Sierra Norte, Aracena, Grazalema.  
*Distribución general.* Europa, N de Africa, W y SW de Asia, Macaronesia.

**1. *Lapsana communis* L., *Sp. Pl.* 811 (1753)**

subsp. **communis**

Tallos de 40-85 cm, erectos. Hojas pubérrulas; las basales largamente pecioladas, liradas, con lóbulo terminal ovado-elíptico, dentado; las medias cortamente pecioladas, de ovadas a lanceoladas, dentadas; las más superiores enteras y bracteiformes. Pedúnculo de 1-3 veces más largo que el involucro. Involucro de 7-8 mm en la fructificación, glabro. Brácteas involucrales externas 12-15 veces más cortas que las internas. Lígulas con tubo de 1,5-2,5 mm y limbo de 5-6 mm. Brazos estilares negros. Aquenios subobcónicos; los externos de c. 4,5 mm, los internos de c. 3,5 mm.  $2n = 14, 16$ . *Florece y fructifica de Mayo a Julio.*



**74. *Catananche* L., *Sp. Pl.* 812 (1753) [*Gen. Pl.*, ed. 5: 354, 1754] (\*)**

Hierbas anuales o perennes, caulescentes. Hojas alternas, de oblanceoladas a linear-lanceoladas, con 3-4 nervios principales paralelos. Capítulos solitarios situados en los extremos de largos pedúnculos a veces sentados y numerosos en la base del tallo. Pedúnculos con hojas bracteiformes. Involucro con numerosas filas de brácteas. Brácteas involucrales externas ovadas, agudas o mucronadas, enteramente escariosas excepto por el nervio medio; las medias e internas panduradas, con parte superior escariosa excepto por el nervio medio. Receptáculo plano con brácteas interseminales subuladas. Lígulas azules o amarillas. Aquenios obpiramidales, pentagonales, con espacios intercostales transversalmente rugosos, pubescentes. Vilano formado por 1 fila de (4-) 5 escamas generalmente aristadas.

Lígulas azules, más largas que el involucro. Parte inferior del tallo sin capítulos. Perenne ..... **2. caerulea**  
Lígulas amarillas, más cortas que el involucro. Parte inferior del tallo con numerosos capítulos sentados. Anual ..... **1. lutea**




Taludes margosos y yesosos. Frecuente. Campiña Baja, Campiña Alta, Subbética, Grazalema, Algeciras.  
*Distribución general.* Región Mediterránea (excepto Baleares, Francia, Yugoslavia y Albania).

**1. *Catananche lutea* L., *Sp. Pl.* 812 (1753)**

*Piptocephalum carpholepis* Schultz Bip., *Bonplandia* 8: 369 (1860)  
*Catananche lutea* subsp. *carpholepis* (Schultz Bip.) Nyman, *Consp.* 472 (1879)

Anuales. Tallos de 6-80 cm, erectos, ramificados en la parte superior, generalmente con hojas casi hasta la parte superior, seríceos. Hojas oblongas, oblanceoladas o linear-lanceoladas, enteras o dentadas, tomentosas. Capítulos solitarios en los extremos de los tallos y casmógamos, o agrupados en el cuello radical y cleistógamos. Involucro de 16-38 x 7-16 mm. Brácteas involucrales exter-



(\*) Por S. Talavera