



En pastizales y matorrales sobre suelos básicos. Alcores, Litoral onubense, Campiña Baja, Campiña Alta, Subbética.
Distribución general. S de Portugal (Algarve), S y SW de España, NW de Africa (Argelia, Marruecos), Macaronesia (Canarias).

16. *Centaurea eriophora* L., *Sp. Pl.* 916 (1753)

Anuales. Tallos de 15-70 cm, erectos, alados, con ramas divaricadas en la mitad superior, generalmente cano-aracnoideos. Hojas decurrentes, cano-aracnoideas, rara vez subglabras; las inferiores oblanceoladas, de enteras a pinnatífidas; las superiores lineares o linear-lanceoladas. Capítulos con hojas involucrantes, solitarios, terminales, a veces axilares en la mitad inferior del tallo. Involucro de c. 20 × 20 mm, subgloboso, blanco-aracnoideo. Brácteas externas y medias ovado-elípticas; apéndice de 13-19 mm, lanceolado, espinoso, no decurrente, generalmente pardo o purpúreo, con 4-6 espigas laterales de hasta 5 mm en la mitad inferior. Flores hermafroditas, amarillas, con tubo de 9-10 mm y limbo de 7,5-8 mm. Aquenios de c. 4 × 2,4 mm, ovoideos, ligeramente comprimidos, escasamente vilosos, generalmente negro-brillantes; hilo cárpico lateral, cóncavo, glabro. Vilano de 6-8 mm, escábrido, negruzco. *2n* = 24. *Florece y fructifica de (Abril) Mayo a Junio.*



Generalmente viaria de suelos margosos. Condado-Aljarafe, Vega, Litoral, Marisma, Campiña Baja, Algeciras.
Distribución general. SW y NE de España, NW de Africa (Argelia y Marruecos), Macaronesia (Madera y Canarias).

17. *Centaurea diluta* Aiton, *Hortus Kew.* 3: 261 (1789)

C. raphanifolia Salzm. ex DC., *Prodr.* 6: 591 (1838), pro syn.

Anuales, escábridas. Tallos de hasta 250 cm, generalmente muy ramificados. Hojas inferiores largamente pecioladas, liradas; las caulinares generalmente enteras, sentadas, auriculadas, con decurrencia de hasta 2,5 cm. Capítulos solitarios, generalmente con una hoja involucrante en la base. Involucro de 17-18 × 10-15 mm, ovoideo. Brácteas involucrales externas y medias ovadas, imbricadas; apéndice semilunado-caudado, dentado-fimbriado, membranoso, decurrente, con 1 espina terminal de hasta 2 mm. Flores rosadas; las externas mucho más largas que las internas, patentes, neutras; las internas erectas, hermafroditas, con tubo de c. 10 mm y limbo de 9-10 mm. Aquenios de 2,5-3 × 1,3 mm, ovoideos, generalmente con c. 12 venas longitudinales, glabros o ligeramente vilosos; hilo cárpico lateral, cóncavo, glabro. Vilano de 4,5-5 mm, blanco. *2n* = 20 (Cádiz, Sevilla). *Florece y fructifica de Mayo a Junio.*

