

1,7 mm; los internos sin glándulas, a veces con una semicorona de hasta 0,7 mm.  $2n = 18$ . Florece y fructifica de Febrero a Mayo.


2. **Matricaria aurea** (Loefl.) Schultz Bip., *Bonblandia* 8: 369 (1860)

*Cotula aurea* Loefl., *Iter Hisp.* 163 (1758)

*C. aurea* L., *Sp. Pl.*, ed. 2: 1257 (1763)  
*Chamomilla aurea* (Loefl.) J. Gay ex  
Cosson & Kralik, *Cat. Pl. Syric. Palaest.* 10 (1854)

*Perideraea aurea* (Loefl.) Willk. in  
Willk. & Lange, *Prodr. Fl. Hisp.* 2: 90 (1865)

Tallos de 4-15 cm, decumbentes, rara vez erectos, ramificados desde la base. Hojas inferiores bipinnatisectas, rara vez tripinnatisectas; las superiores pinnatisectas. Capítulos solitarios. Pedúnculos no ensanchados en la parte superior. Involucro de c.  $2 \times 5$  mm, subglabro. Brácteas involucrales panduradas, con margen generalmente negruzco y discoloro, rara vez concoloro. Capítulos discoideos. Flores flosculosas de 0,8-1 mm, con 4 dientes, amarillas o verdeamarillentas. Aquenios de 0,7-0,9 mm, sin glándulas. Vilano ausente.  $2n = 18$ . Florece y fructifica de Febrero a Mayo.




Viaría y algo nitrófila, en suelos húmedos.

Muy rara. Pedroches, Vega.

Distribución general. C, S y SE de la Península Ibérica, N de Africa, SW de Asia.

30. **Cladanthus** Cass., *Bull. Soc. Philom. Paris* 1816: 199 (1816) (\*)

Hierbas anuales, caulescentes. Tallos erectos, simpódicos, con ramificación verticilada debajo de los capítulos. Hojas bi o pinnatisectas, con lóbulos lineares cortamente apiculados. Capítulos sentados. Involucro con 2 (-3) filas de brácteas. Receptáculo cónico o subsférico, con brácteas y pelos interseminales. Capítulos radiados y heterógamos, con flores externas hemiliguladas, femeninas, estériles, amarillas, con una banda generalmente purpúrea por el dorso y flores internas flosculosas y hermafroditas. Flores flosculosas con una prolongación sacciforme basal que envuelve desigualmente a la mitad superior del aquenio. Aquenios obovoideos, con numerosas costillas longitudinales; pericarpo membranoso. Vilano ausente.



1. **Cladanthus arabicus** (L.) Cass., *Dict. Sci. Nat.* 9: 342 (1817)

*Anthemis arabica* L., *Sp. Pl.* 846 (1753)  
*Cladanthus proliferus* DC., *Prodr.* 6: 18 (1838)

Tallos de 40-60 cm, ramificados en la mitad superior, con un verticilo de 3-5 ramas por debajo del capítulo terminal, y ramas igualmente ramificadas. Hojas largamente pecioladas, glanduloso-punteadas; las inferiores bipinnatisectas; las superiores pinnatisectas o trifidas. Brácteas involucrales ova-do-oblongas, con un apéndice escarioso ancho. Brácteas interseminales naviculiformes, aristadas, dorsalmente barbadas. Flores he-



Suelos básicos o ácidos. Muy raro.

Algeciras (Gibraltar).

Distribución general. S de España (Cádiz y Málaga), NW de Africa (NW de Marruecos, W de Argelia).

(\*) Por S. Talavera