



Raro. Campiña Alta.
Distribución general. W de la Región
Mediterránea.

3. *Daucus aureus* Desf., *Fl. Atl.* 1: 242 (1798)

Anuales o bienales. Tallos de 15-60 cm, glabros o escábridos. Hojas (2-) 3 pinnatisectas, con lóbulos terminales de lineares a lanceolados, glabrescentes. Umbelas largamente pedunculadas, con 18-30 radios ligeramente desiguales y 5-11 brácteas pinnatisectas, reflejas en la fructificación. Umbelas de segundo orden con 5-9 bracteolas generalmente pinnatisectas. Pétalos amarillentos o claramente amarillos después de la antesis. Frutos de 4-6,1 mm, de contorno elíptico; costillas primarias con 1-2 filas de pelos simples; costillas secundarias con 5-8 espinas más largas que la anchura de los mericarpos, rígidas, no o muy ligeramente confluentes en la base; vitas ausentes o apenas marcadas. Estilopodio con excrecencias basales. Estilos de 1,3-2 mm. Endospermo cóncavo. $2n = 22$. *Florece de Abril a Junio*.



Bordes de caminos y márgenes de
cultivos. Raro. Sierra Norte
cordobesa, Alcores.
Distribución general. Mitad S de la
Península Ibérica, NW de África.

4. *Daucus setifolius* Desf., *Fl. Atl.* 1: 242 (1798)

D. brachylobus Boiss., *Voy. Bot. Midi
Esp.* 2: 258 (1840)

Perennes. Tallos de hasta 100 cm, glabros o muy laxamente pubescentes. Hojas con segmentos aparentemente verticilados y los de último orden lineares. Umbelas terminales largamente pedunculadas, con 10-20 radios subiguales y 4-8 brácteas trifidas o pinnatisectas; las laterales generalmente opuestas a las hojas. Umbelas de segundo orden con bracteolas setáceas. Frutos de 4-6,7 mm, de contorno oblongo o elíptico, tomentosos, con espinas más cortas que la anchura del mericarpo, blandas; con 1 vita bajo cada costilla secundaria y 2 vitas comisurales. Estilos de 1,8-2,5 mm. Endospermo cóncavo. $2n = 22$. *Florece de Mayo a Junio (Julio)*.

