

15. *Daucus*

tes, a veces con pelos esparcidos en la mitad inferior, y escábridos –pelos retrorsos– en la mitad superior. Hojas de contorno estrechamente oblongo o lanceolado; las basales 3-4(5) pinnatisectas, con divisiones de último orden cortas, linear-lanceoladas, largamente mucronadas, con pecíolo largo, híspero –pelos patentes o reflejos–, haz subglabra –pelos esparcidos, rígidos y antrorsos en el margen de los lóbulos–, y envés hirta en los nervios y en el margen; las superiores escasas, 1-2 pinnatisectas, lóbulos linear-lanceolados o lineares, de glabras a glabrescentes –con pelos, esparcidos, solo en el raquis y vaina–. Umbelas de 1,5-4(5) cm de diámetro, de planas a ligeramente cóncavas, con radios poco arqueado-convergentes o \pm rectos (poco contraídas) en la fructificación, con 12-25 radios, desiguales (los internos 5-10 mm, los externos 8-17 mm), escábridos –pelos antrorsos o patentes, en mayor densidad en el ápice–, a veces subglabros. Brácteas 6-8(10), de longitud mucho menor –raramente igual– que la de los radios, adpresas, raramente reflejas, indivisas –sublineares–, bífidas o 1 vez pinnatisectas –lóbulos sublineares–, glabras, con amplio margen escarioso y cortamente ciliado solo en el ápice. Bractéolas 6-9, de longitud igual o mayor que la de las flores, lanceoladas, indivisas, raramente trífidas, adpresas, glabras, con amplio margen escarioso y ciliado. Flor central estéril y purpúrea generalmente ausente. Pétalos obovados, generalmente emarginados, incurvados, blancos; los externos de las flores exteriores ligeramente mayores –0,8-1,5 mm– que los internos –0,6-1 mm–. Anteras amarillas. Estilos 0,4-0,5 mm –0,6-1,2 mm, divergentes en la fructificación–. Frutos 2-2,8 \times 1,3-1,9 mm, ampliamente elípticos, de color castaño; mericarpos con las costillas primarias provistas de 2-3 hileras de pelos rígidos; las secundarias con espinas de c. 0,5 mm, mucho más cortas que la anchura de los mericarpos, gruesas, algo dilatadas y ligeramente confluentes en una cresta en la base, antrorsas, rectas o curvadas, con gloquidios de 1-2(3) púas.

Claros de bosque, brezales; 600-1500 m. VII-VIII. ● N y C de la Península Ibérica –vertiente S de la Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico–. **Esp.:** Bu Cu P So Te.

e. subsp. *hispanicus* (Gouan) Thell. in Repert. Spec. [hispánicus]
Nov. Regni Veg. 22: 312 (1926)

D. hispanicus Gouan, Ill. Observ. Bot.: 9 (1773) [basión.]

D. gummifer Lam., Encycl. 1: 634 (1785), nom. illeg.

D. gingidium subsp. *hispanicus* (Gouan) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 84 (1974)

D. gingidium auct., non L., Sp. Pl.: 242 (1753)

Ind. loc.: “Ad mare juxta Perpignan & Colliouvre non infrequens”

lc.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5(2): 1520 fig. 2580 b (1926); fig. 6 a2 y b2

Planta perennizante, de (5)10-45(77) cm, \pm erecta, ramificada desde la base, de color verde oscuro brillante. Raíz no napiforme, blanquecina. Tallos glabros, a veces escábridos –pelos retrorsos–, raramente hísperos –pelos largos, en gran densidad– en el tercio inferior, de verdosos a castaños claro. Hojas basales de contorno ovado, 1-3(4) pinnatisectas, de color verde oscuro brillante, con divisiones de último orden oblongas, elípticas o lanceoladas, con ápice obtuso,