




Lugares abiertos y soleados.  
Frecuente en todo el territorio.  
Distribución general. Península  
Ibérica, NW de África.

5. **Daucus crinitus** Desf., *Fl. Atl.* 1: 242 (1798)

*D. meifolius* Brot., *Phyt. Lusit.* 1: 82,  
tab. 36 (1800)

Perennes. Tallos de hasta 75 cm, glabros. Hojas con lóbulos sentados aparentemente verticilados; los terminales lineares. Umbelas largamente pedunculadas, con 10-30 radios desiguales y 5-10 brácteas mucho más cortas que los radios. Umbelas de segundo orden con 6-8 bracteolas. Frutos de 4,2-7,3 mm, de contorno ovado-elíptico; costillas primarias con 2 filas de pelos simples; costillas secundarias con espinas más largas que la anchura de los mericarpos, blandas, no confluentes en la base, frecuentemente purpúreas; con 1 vitta bajo cada costilla secundaria y 2 vitas comisurales. Estilos de (2-) 2,5-4,7 mm. Endospermo plano.  $2n = 18, 22$ . *Florece de Mayo a Julio*.



6. **Daucus carota** L., *Sp. Pl.* 242 (1753)

Anuales o bienales. Tallos de 10-150 cm, hispídeos, rara vez glabros. Hojas 2-3 pinna-tisectas con segmentos generalmente pubescentes. Umbelas largamente pedunculadas, con 10-30 (-45) radios y 5-11 brácteas. Pétalos blancos; los de la flor central de cada umbela frecuentemente púrpura oscuros o negros. Frutos de 1,5-3,5 (-4) mm; costillas primarias con 2 filas de pelos simples; las secundarias con 8-14 espinas más cortas o más largas que la anchura del mericarpo, ligeramente confluentes en la base; con 1 vitta bajo cada costilla secundaria y 2 vitas comisurales. Estilos de hasta 2 mm.

1. Umbelas con radios rectos en la fructificación ..... c. subsp. **hispanicus**
1. Umbelas con radios convergentes en la fructificación ..... 2
2. Umbelas de (10-) 12-30 cm de diámetro en la antesis. Frutos de 1,5-2,7 mm ..... b. subsp. **maximus**
2. Umbelas de 4-10 cm de diámetro en la antesis. Frutos de 2,5-3,5 mm ..... a. subsp. **carota**.

a. subsp. **carota**

Tallos de hasta 80 cm. Umbelas de 4-10 cm de diámetro, planas en la antesis, con radios convergentes en la fructificación. Frutos de 2,5-3,5 mm, con espinas más cortas que la anchura del mericarpo.  $2n = 18$ . *Florece de Mayo a Junio (Julio)*.



Muy frecuente por todo el territorio.  
Distribución general. Europa.

