




Frecuente en lugares abiertos y soleados. Todo el territorio.
Distribución general. Península Ibérica, NW de África.

1. *Daucus durieua* Lange in Willk. & Lange,
Prodr. Fl. Hisp. 3: 23 (1874)

Durieua hispanica Boiss. & Reuter,
Diagn. Pl. Nov. Hisp. 14 (1842)

Anuales, hispídas. Tallos de 8-30 cm. Hojas 2-3 pinnatisectas con lóbulos terminales lineares o linear-lanceolados y pecíolo y nervios escábridos. Umbelas axilares, sentadas o subsentadas, con 3-6 radios muy desiguales, escábridos, y 3-7 brácteas semejantes a las hojas. Umbelas de segundo orden con 3-5 bracteolas enteras y linear-lanceoladas o pinnatífidas. Frutos de 3,5-6 mm, de contorno oblongo-elíptico; costillas primarias con varias filas de pelos simples; costillas secundarias con espinas 1,5-2 veces más anchas que el mericarpo, rígidas, ligeramente dilatadas en la base y escasamente confluentes; con 1 vita bajo cada costilla secundaria y 2 vitas comisurales. Estilos de hasta 0,5 mm. Endospermo plano o ligeramente cóncavo. $2n = 20, 22$. Florece de (Marzo) Abril a Mayo.



Nitrófila. Todo el territorio.
Distribución general. C y W de la Región Mediterránea.

2. *Daucus muricatus* (L.) L., *Sp. Pl.*, ed. 2:
349 (1762)

Arteria muricata L., *Sp. Pl.* 242 (1753)

Anuales, hispídas. Tallos de 25-60 cm, ramificados desde la base. Hojas 2-3 pinnatisectas con lóbulos terminales oblongo-lanceolados o lineares y pecíolo y nervios hispídos. Umbelas largamente pedunculadas, con 7-25 (-30) radios y 4-9 brácteas pinnatisectas, rara vez trífidas, reflejas en la fructificación. Umbelas de segundo orden con 4-9 bracteolas enteras y lineares o trífidas. Frutos de 5-10 mm, de contorno elíptico; costillas primarias con (1-) 2 (-3) filas de pelos simples; costillas secundarias con 5-7 espinas más largas que la anchura de los mericarpos, rígidas, claramente confluentes en la base; con 1 vita bajo cada costilla secundaria y 2 vitas comisurales. Estilos de hasta 1,7 mm. Endospermo cóncavo. $2n = 22$. Florece de Abril a Mayo (Junio).

