



Muy frecuente en todo el territorio.  
Distribución general. Región  
Mediterránea.

b. subsp. **maximus** (Desf.) Ball., *Journ. Linn. Soc. London (Bot.)* 16: 476 (1878)

*Daucus maximus* Desf., *Fl. Atl.* 1: 241 (1798)

Tallos de hasta 100 cm, robustos. Umbelas de (10-) 12-30 cm de diámetro, planas en la antesis, con radios convergentes en la fructificación. Frutos de 1,5-2,7 mm, con espinas más cortas que la anchura del fruto.  $2n = 18$ . *Florece de (Abril) Mayo a Julio.*



Lugares cercanos a la costa. Raro.  
Litoral gaditano. Algeciras.  
Distribución general. Costas de la  
Región Mediterránea.

c. subsp. **hispanicus** (Gouan) Thell., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 22: 312 (1926)

*Daucus hispanicus* Gouan, *Obs. Bot.* 9 (1773)

*Daucus gaditanus* Boiss. & Reuter, *Diagn. Pl. Or. Nov.*, ser. 2, 2: 96 (1856)

Tallos de hasta 100 cm, robustos. Umbelas planas en la fructificación, con 15-30 (-45) radios más largos que las brácteas y rectos en la fructificación, brácteas reflejas. Frutos de 3-3,5 (-4) mm, de contorno elíptico.  $2n = 18$ . *Florece de Abril a Mayo (Junio).*

