



Lugares secos, campos incultos y cultivos abandonados. Muy frecuente. Todo el territorio.
Distribución general. W, C y S de Europa, N de África, SW de Asia.

8. *Eryngium campestre* L., *Sp. Pl.* 233 (1753)

Perennes, verde pálidas, con raíz tuberosa. Tallos de 20-60 cm, erectos, generalmente simples. Hojas coriáceas; las basales persistentes, con pecíolo tan largo como el limbo, ensanchado en la base en vaina abrazadora, marcadamente espinoso-serrada, y limbo de 5-20 cm, de romboidal a ovado-triangular, 1-2 pinnatisecto, con lóbulos de oblongos a obovados, con dientes anchos terminados en una espina fuerte; las caulinares medias sentadas, con vaina bien marcada, 1-pinnatisectas, con lóbulos de oblongos a lanceolados, marcadamente dentados y espinosos. Inflorescencia en pleiocasio umbeliforme; capítulos de 1-2 cm, numerosos, pedunculados, ovoideos, con (4-) 6-8 brácteas; brácteas de 20-47 × (2-) 3-4 (-6) mm, linear-lanceoladas, con (0-) 1-2 (3-) pares de espinas; bracteolas de 7-14 mm, enteras, subuladas. Sépalos de c. 2,5 mm, ovado-lanceolados, aristados. Fruto densamente escamoso, con escamas planas ovado-lanceoladas, glabras o muy ligeramente pubérulas, pardas. $2n = 14, 28$. *Florece de Mayo a Septiembre.*



Lugares temporalmente encharcados y pequeñas lagunas. Andévalo, Campiña de Huelva, Litoral, Marisma, Campiña Baja.
Distribución general. Península Ibérica, Cerdeña.

9. *Eryngium corniculatum* Lam., *Encycl. Méth., Bot.* 4: 758 (1798)

Anuales, rara vez bienales, glaucescentes. Tallos de 15-50 (-60) cm, fistulosos, erectos, escasamente ramificados. Hojas fistulosas; las basales prontamente caducas, con pecíolo grueso, cilíndrico, con numerosos tabiques transversales y limbo de 2-5 cm, ovado-oblongo, remotamente dentado; las caulinares medias con limbo ovado u ovado-lanceolado, irregularmente pinnatífidas, con lóbulos espinosos; las caulinares superiores 5-partidas, espinosas. Inflorescencias en dicasio, rara vez en pleiocasio umbeliforme, con numerosos capítulos; capítulos de 0,5-1 cm, pedunculados, subglobosos, frecuentemente azulados, con eje prolongado en forma de bráctea espinosa, con (3-) 5-6 (-7) brácteas; brácteas de 1,5-3 (-5) cm, enteras, subuladas; bracteolas ovado-lanceoladas, largamente aristadas. Sépalos de 1-1,5 mm, oblongo-lanceolados, cortamente aristados. Fruto densamente escamoso, con escamas de 0,3-1,5 mm, pubérulas, blancas. $2n = 16$ (Huelva, Sevilla). *Florece de Mayo a Octubre.*

