




Zonas con encharcamiento estacionario. Vega, Litoral.  
*Distribución general.* Endémico de la mitad W de la Península Ibérica (Provincias Atlántica, Carpetano-Ibérico-Leonesa, Luso-Extremadurensis, Gaditano-Onubense-Algarviense y Bética).

**2. *Eryngium galioides* Lam., *Encycl. Méth.*, *Bot.* 4: 757 (1798)**

Frecuentemente anuales, a veces azuladas. Tallos de 4-15 cm, erectos o decumbentes. Hojas basales de 2-6,5 x 0,5-0,8 cm, prontamente caducas, largamente pecioladas, con limbo de oblongo-lanceolado a oblanceolado, entero o profundamente inciso-serrado, no o ligeramente atenuado en la base; las caulinares medias sentadas, oblongas, frecuentemente con 2 lóbulos basales y espinosos. Inflorescencia en dicasio denso antes de la antesis y muy ramificado en la fructificación, con más de 20 capítulos. Capítulos de 3-8 mm, pedunculados, frecuentemente con 5 flores y con 5 (6-8) brácteas; los centrales solitarios; los laterales frecuentemente en grupos de 3; brácteas de 8-11 x 1-3 mm, lanceolado-acuminadas, con 1 (-2) pares de espinas y base ampliamente membranosa y abrazadora; sin bracteolas o con una bracteola semejante a las brácteas. Sépalos de 0,7-1,6 x 0,5-0,8 mm, ovados, aristados. Fruto escamoso sólo en la base del ápice. 2n = 16. *Florece en Junio.*



Lugares secos, preferentemente sobre suelos básicos. Alcores, Litoral, Algeciras.  
*Distribución general.* S de España, NW de África.

**3. *Eryngium ilicifolium* Lam., *Encycl. Méth.*, *Bot.* 4: 757 (1798)**

Anuales, glaucescentes. Tallos de 2-15 cm, decumbentes o erectos, frecuentemente muy ramificados. Hojas basales persistentes, ligeramente coriáceas, con pecíolo ligeramente más corto que el limbo y limbo de 8-20 x 0,5-2,2 cm, de obovado a suborbicular, ampliamente serrado-dentado; las caulinares medias de 2-3 cm, elípticas, pinnatifidas, con 3-6 dientes triangulares y espinescentes. Inflorescencia muy laxa, a veces azulada, con capítulo central de 10-12 mm, sentado, largamente sobrepasado por las ramificaciones laterales, con 5-8 brácteas; brácteas de 1,5-3,5 cm, de oblanceoladas a obovado-rómbicas, pinnatipartidas, con 1-3 (-4) dientes triangulares espinescentes; bracteolas de 8-15 mm, romboideas, tricuspidadas, con base anchamente alada; las más internas con espina terminal más larga que la de las externas. Sépalos de 1-2 mm, ovados, aristados. Frutos densamente cubiertos por protuberancias papilosas de 0,3-0,6 mm, blancas e insertas en las costillas. 2n = 16, 18. *Florece de Junio a Julio.*

