

3. *Eryngium* L., *Sp. Pl.* 232 (1753) [*Gen. Pl.*, ed. 5: 108, 1754] (*)

Hierbas perennes o anuales, espinosas, glabras. Inflorescencias capituliformes, reunidas en umbelas o racimos con 5-80 flores rodeadas por brácteas y con bracteolas interflorales. Brácteas y bracteolas generalmente con margen engrosado y espinoso. Dientes del cáliz con un apéndice espinoso. Pétalos emarginados, más cortos que los sépalos y recubriendo lateralmente a los estambres antes de la antesis. Frutos ovoideos o subglobosos, escamosos, con mericarpos plano-convexos, sin carpóforo.

Las medidas del capítulo se refieren a los centrales de la inflorescencia y no incluyen la longitud de las brácteas.

1. Eje de la inflorescencia prolongado en un apéndice espinoso. Hojas basales fistulosas 9. *corniculatum*
1. Inflorescencias no prolongadas en un apéndice espinoso. Hojas basales no fistulosas 2
2. Capítulos centrales sentados 3
2. Capítulos centrales pedunculados 4
3. Capítulos centrales de 10-12 mm. Flores no protegidas por la base envainante de las brácteas. Bracteolas numerosas 3. *ilicifolium*
3. Capítulos centrales de 3-8 mm. Flores protegidas por la base envainante de las brácteas. Sin bracteolas o con 1 bracteola 2. *galioides*
4. Bracteolas internas tetracuspidadas 1. *tenué*
4. Bracteolas internas 1-3 cuspidadas 5
5. Brácteas ovadas. Sépalos de c. 4,5 mm 5. *maritimum*
5. Brácteas lanceoladas o linear-lanceoladas. Sépalos de menos de 4 mm 6
6. Hojas basales oblanceoladas o espatuladas, a veces con espinas largas muy delgadas en la base 7
6. Hojas basales de suborbiculares a ovado-trianguulares, sin espinas largas y delgadas en la base 8
7. Hojas basales enteras 4. *aquifolium*
7. Hojas basales divididas 7. *dilatatum*
8. Hojas basales enteras. Bracteolas tricuspidadas 6. *tricuspdatum*
8. Hojas basales 1-2 pinnatisectas. Bracteolas enteras 8. *campestre*




Lugares secos, preferentemente en suelos arenosos ácidos. Poco frecuente. Pedroches, Sierra Norte, Litoral.

Distribución general. Península Ibérica, NW de Africa.

1. *Eryngium tenue* Lam., *Encycl. Méth., Bot.* 4: 755 (1798)

Anuales, a veces azuladas. Tallos de (2-) 4-30 (-40) cm, erectos, generalmente simples. Hojas con lóbulos espinosos; las basales de 1-2 cm, rosuladas, sentadas o cortamente pecioladas, obovadas, irregularmente pinnatífidas, decurrentes; las caulinares medias atenuadas, 5-7 partidas, con lóbulos linear-lanceolados. Inflorescencia frecuentemente en dicasio umbeliforme, con 3-12 capítulos. Capítulos de 0,5-1 (-1,5) cm, pedunculados, de globosos a ovoideos, con 6 a 9 brácteas; brácteas de 0,5-2 cm, estrechamente linear-lanceoladas, con 6-10 (-12) pares de espinas; bracteolas tetracuspidadas. Sépalos lanceolados, cortamente aristados. Fruto densamente cubierto por protuberancias papilares de 0,1-0,3 mm, blancas, preferentemente sobre las costillas. $2n = 16$. *Florece en Agosto.*



(*) Por S. Silvestre