




Pastizales y matorrales muy degradados, sobre suelos básicos. Frecuente. Campiña Baja gaditana, Campiña Alta gaditana, Grazalema, Algeciras.

*Distribución general.* W de la Región Mediterránea.

**6. Eryngium trispidatum L., *Demonstr. Pl.* 8 (1753)**

Perennes, con raíz tuberosa. Tallos de 15-90 cm, erectos, simples, muy rara vez ramificados. Hojas no coriáceas; las basales persistentes, con pecíolo de hasta 7 veces la longitud del limbo, ensanchado en la base, y limbo de 2-6 × 1,5-5 cm, de oblongo-ovado a suborbicular, de crenado-dentado a lacinado, cordado; las caulinares medias 6-7 partidas. Inflorescencia terminal en dicasio, rara vez en pleiocasio, con 3-13 capítulos; capítulos de c. 1 cm, pedunculados, hemisféricos, con (4-) 5-7 brácteas; brácteas de 1-5 × 1,1-2,3 cm, estrechamente linear-lanceoladas, con 4-8 pares de dientes espinosos; bracteolas linear-lanceoladas, trispidadas. Sépalos de c. 2 mm, ovados, mucronados. Frutos con escamas dispuestas sobre las costillas, agudas, trígonoas, blancas.  $2n = 16$ . *Florece de Junio a Agosto.*



Lugares secos, preferentemente calcáreos. Muy frecuente. Litoral gaditano, Campiña Baja gaditana, Subbética, Grazalema, Algeciras. *Distribución general.* Península Ibérica, NW de Africa.

**7. Eryngium dilatatum Lam., *Encycl. Méth., Bot.* 4: 755 (1798)**

Perennes, frecuentemente azuladas, con raíz gruesa. Tallos de 10-40 cm, erectos, simples, rara vez ramificados. Hojas ligeramente coriáceas; las basales de 2-13 cm, persistentes, con limbo espatulado, 3-secto en la parte distal y ampliamente atenuado y pinatifido hasta la vaina; vaina ancha, con espinas largas y muy delgadas; las caulinares medias 3-partidas, con espinas fuertes. Inflorescencia poco ramificada, racemosa, con 12-20 capítulos subglobosos, cada uno con 6-9 brácteas; el central de (1-) 2-5 cm, largamente pedunculado; los laterales frecuentemente subsentados; brácteas de (20-) 26-40 × 3-6 mm, de lanceoladas a linear-lanceoladas, con (4-5-) 6-9 pares de espinas; bracteolas de 7-16 mm, enteras. Sépalos de c. 2,5 mm, ovado-lanceolados, largamente aristados. Fruto con escamas sobre las costillas, generalmente ovado-lanceoladas, planas, más densas y espinosas en la parte apical.  $2n = 16$ . *Florece de Junio a Agosto (Septiembre).*

