

19. Suaeda

brana utricular muy tenue, que se abre. Semilla 0,8-1,1 × 0,5-0,7 mm, con testa negra, granular, brillante, glabra. $2n = 18$.

Saladares del interior con clima continental, seco y soleado, en poblaciones aisladas; 200-700 m. VI-IX. Región mediterránea occidental. C de la Península, valle del Ebro y depresión de Guadix.
Esp.: Ab Cu CR Gr Hu L M Na Te To Va Z.

19. Suaeda Forssk. ex Scop. [nom. cons.]*

[Suáeda f. – ár. *sáuda* = sosa. Según Forsskål, el nombre vernáculo de la *S. vera*, tanto en Egipto como en Arabia, es "suaed"]

Anuales o perennes. Tallos no articulados. Hojas alternas, carnosas. Flores hermafroditas y femeninas, en glomérulos axilares, con 2-3 bractéolas escariosas. Piezas del perianto 5, verdes, normalmente suculentas, sin apéndice dorsal ni ala transversal –a veces con rudimentos de menos de 1 mm–, raramente engrosadas en la fructificación. Estambres 5. Ovario súpero; estigmas 2-3 cortos y filiformes o más de 3 y ± planos. Semillas horizontales o verticales, ± convexas, testa crustácea, de areolada a escalariforme, pero en algunas especies los ejemplares de fructificación tardía presentan también semillas con testa membranácea; perisperma nulo; embrión en espiral.

Bibliografía.–J. PEDROL & S. CASTROVIEJO in Anales Jard. Bot. Madrid 45: 93-102(1988).

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Perennes, leñosas | 2 |
| – Anuales, herbáceas | 3 |
| 2. Estigmas (2)3, de 0,4-1 mm, filiformes, planta con pelos blanquecinos, ± pruinosa | 1. S. pruinosa |
| – Estigmas (3)5 o más, de menos de 0,5 mm, ± triangular-subulados y soldados por la base en una especie de disco; planta ± glabra | 2. S. vera |
| 3. Hojas con reborde hialino, con acumen de ± 1 mm, éste, a veces, acaba cayendo en la madurez; anteras de más de 0,4 mm | 3. S. splendens |
| – Hojas sin reborde hialino, con ápice de obtuso a ± agudo; anteras de menos de 0,4 mm | 4-6 gr. S. maritima |

- 1. S. pruinosa** Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. [pruinósa]
Foren. Kjøbenhavn 1861: 45 (1861)

S. vera subsp. *pruinosa* (Lange) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 89 (1974)
Ind. loc.: "In salinis pr. Murciam urbem (25 Nov. c. fr.)!"
lc.: Lám. 161

Perenne, de hasta 50 cm, leñosa, glauca, ± pruinosa. Tallos ± postrados; con pelos blanquecinos, al igual que los brotes y hojas jóvenes. Hojas de hasta 4,5(8) × 1,3(2) mm, semicilíndricas y con ápice que va de obtuso a ligeramente agudo; las de la inflorescencia de 2(4) mm, normalmente imbricadas. Flores de 0,8-2 mm de diámetro, sésiles, agrupadas en glomérulos de 3(5). Piezas del perianto de hasta 0,7 mm. Anteras 0,7-1,1 mm. Ovario subcilíndrico. Estigmas (2)3, de 0,4-1

* J. Pedrol & S. Castroviejo