

limbo. Aquenios de 3-3,5 mm, con 1 ala ventral bien desarrollada, rara vez los más internos sin ala; los externos con 2 alas laterales y 2 costillas dorsales; los internos ligeramente comprimidos lateralmente, con 3-4 costillas en ambas caras.  $2n = 18$ . *Florece y fructifica de Febrero a Mayo (Noviembre-Diciembre)*.

El color de las hemilígulas es variable. En Andalucía Occidental dominan las poblaciones con hemilígulas discoloras, habiéndose observado poblaciones con hemilígulas totalmente amarillas sólo en el Litoral y en la Vega del Guadalquivir. Las formas con hemilígulas discoloras han recibido el nombre de var. **discolor** d'Urv., *Enum. Pl. Ins. Pont. Eux.* 112 (1822).



Nitrófilo. En herbazales y bordes de caminos de lugares húmedos. Todo el territorio.

*Distribución general.* Casi toda Europa, Cáucaso, N de Africa, SW de Asia, Macaronesia (excepto Cabo Verde).

**2. *Chrysanthemum segetum* L., *Sp. Pl.* 889 (1753)**

Glabras, glaucas. Tallos de hasta 50 cm, generalmente ramificados en la mitad inferior. Hojas inferiores pecioladas, profundamente inciso-dentadas, las superiores generalmente amplexicaules, enteras o ligeramente dentadas. Involucro de 13-18 mm de diámetro. Brácteas involucrales triangular-ovadas, con margen escarioso pardo o verde-amarillento; las más internas con apéndice escarioso obtuso. Flores hemiliguladas con limbo de hasta 17 mm, amarillo-oro; las flosculosas de 3,5-4,5 mm, con limbo ligeramente más corto que el tubo, campanulado. Aquenios de 2-2,5 mm; los más externos ligeramente comprimidos, con 2 alas laterales estrechas, 3 costillas en la cara dorsal y 5 costillas en la cara ventral; los internos cilíndricos, con 10 costillas.  $2n = 18$ . (Córdoba). *Florece y fructifica de Febrero a Junio*.



**44. *Heteranthemis* Schott, *Isis* 1818 (5): 822 (1818) (\*)**

Hierbas anuales, viscosas, hispidas, con largos pelos glandulares, caulescentes. Hojas de subenteras a inciso-serradas. Capítulos solitarios, terminales. Involucro con 2-3 filas de brácteas. Brácteas involucrales con margen escarioso ancho. Receptáculo convexo-cónico, sin brácteas interseminales. Capítulos radiados y heterógamos, con flores externas hemiliguladas, femeninas, amarillas, y flores centrales flosculosas y hermafroditas. Flores flosculosas con tubo cilíndrico y limbo tan largo como el tubo. Aquenios heteromorfos; los externos con 3 alas; los internos con una costilla alada. Vilano ausente.

(\*) Por S. Talavera