



Pastizales secos, sobre suelos ácidos. Muy frecuente. Todo el territorio. *Distribución general.* Casi toda Europa, NW de Africa, SW de Asia, Macaronesia; introducido en otras partes del Globo.

**3. Hypochaeris glabra L., Sp. Pl. 811 (1753)**

*H. minima* Cyr., *Pl. Rar. Neap.* 1: 10 (1788)

*H. balbisii* Loisel., *Not. Pl. Fr.* 124 (1810)

*H. glabra* var. *loiseleuriana* Godron, *Fl. Lorr.* 2: 58 (1843)

*H. glabra* var. *errostris* Boiss., *Fl. Or.* 3: 783 (1875)

Anuales. Tallos de 2-40 cm, simples o ramificados en la mitad superior, glabros. Todas las hojas basales, de enteras a lobadas, rara vez pinnatífidas, glabras o ligeramente hispídas. Pedúnculos glabros no engrosados en la parte superior. Involucro de 13-18 × 3-14 mm. Brácteas involucrales generalmente glabras, rara vez con algunos pelos setosos en el nervio medio. Flores amarillas, con tubo de 2-4 mm y limbo de 2,5-4 mm. Aquenios escábridos; los externos de 2,6-4 mm, generalmente sin pico; los internos de (3-) 7-12 mm, generalmente con pico de 4-8 mm. Vilano de 8-12 mm, formado por varias filas de pelos, los más externos generalmente escábridos, los internos plumosos.  $2n = 10$  (Huelva, Sevilla). *Florece y fructifica de Febrero a Mayo.*



Taludes y grietas de rocas generalmente básicas. Litoral gaditano, Campiña Baja gaditana, Campiña Alta, Subbética, Grazalema, Algeciras. *Distribución general.* Región Mediterránea, Macaronesia (Tenerife).

**4. Hypochaeris achyrophorus L., Sp. Pl. 810 (1753)**

*Seriola aethnensis* L., *Sp. Pl.*, ed. 2: 1139 (1963)

*Hypochaeris aethnensis* (L.) Bentham & Hooker, *Gen. Pl.* 2 (1): 520 (1873)

Anuales. Tallos de 12-40 cm, ramificados en la mitad superior, afilos o con 2-3 hojas, glabros. Hojas de dentadas a lobadas, todas basales, ligeramente hispídas. Pedúnculos hirsutos. Involucro de 6-11 × 3,5-6 mm en la fructificación, con 2-3 filas de brácteas. Brácteas involucrales externas muy pequeñas, todas con nervio medio setoso-hispido, con setas de 2-3 mm, biseriadas, generalmente negruzcas. Lígulas con tubo de 3-5 mm y limbo de 6-10 mm, amarillo-oro. Aquenios de (4-) 5-7 mm, rugosos transversalmente, con pico de (1-) 2-4 mm; los más externos sin vilano; los internos con vilano formado por 2 filas de pelos; la externa con pelos de 0,5-1 mm y escábridos; la interna con pelos de 4-5,5 mm y plumosos.  $2n = 12$ . *Florece y fructifica de Abril a Mayo.*

