




En pastizales húmedos. Frecuente.
Todo el territorio.

Distribución general. Europa, N de
África, SW de Asia, Macaronesia
(Canarias); naturalizado en Nueva
Zelanda.

1. *Hypochaeris radicata* L., *Sp. Pl.* 811 (1753)

H. radicata var. *heterocarpa* Moris, *Fl. Sard.* 2: 487 (1840-1843)

Perennes. Sistema radical fasciculado o divaricado, con raíces fusiformes y tuberosas. Tallos de 15-90 cm, afilos, ramificados en la mitad superior, glabros. Hojas todas basales, generalmente runcinadas, híspidas. Involucro de 15-20 × 13-16 mm en la fructificación. Brácteas involucrales muy frecuentemente con una fila de pelos setosos y erecto-patentes en el nervio medio. Flores amarillas, frecuentemente las más externas verdosas en el dorso, con tubo de 4-8 mm y limbo de 8-11 mm. Aquenios de 4-17 mm, ligeramente muricados; los externos a veces sin pico; los internos con pico de (2,5-)9-12,5 mm. Vilano de 9-10,5 mm, formado por varias filas de pelos, los más externos frecuentemente escábridos, los internos plumosos. $2n = 8$ (Cádiz, Sevilla). *Florece y fructifica de Abril a Septiembre.*



Arenales marítimos. Litoral gaditano,
Algeciras.

Distribución general. SW de España
(Provincia Gaditano-Onubo-
Algarviense, Sector Gaditano), NW de
Marruecos.

2. *Hypochaeris salzmänniana* DC., *Prodr.* 7: 19 (1838)

H. dimorpha Salzm., *Pl. Exsicc.*, nom.
nudum, non Brot., *Fl. Lusit.* 1: 332
(1804)

H. glabra var. *salzmänniana* (DC.) Amo,
Fl. Fanerog. Ibér. 4: 497 (1872)

H. glabra subsp. *salzmänniana* (DC.)
Maire in Jahandiez & Maire, *Cat. Pl. Maroc* 3: 831 (1934)

Anuales. Tallos de 6-30 cm, afilos o con 1-2 hojas, simples o ramificados en la mitad superior, generalmente hirsutos. Hojas de dentadas a pinnatifidas, híspidas. Pedúnculos marcadamente clavados, generalmente hirsutos. Involucro de 17-20 × 10-13 mm. Brácteas involucrales con una fila de pelos setosos y erecto-patentes en el nervio medio, con una excrecencia crestada apical. Flores amarillas; las externas verdosas en el dorso; tubo de 5,5-6,5 mm y limbo de 10-12 mm. Aquenios escábridos; los externos de 4-5 mm, sin pico; los internos de 8-9 mm, con pico de 3-5 mm. Vilano de 10,5-16 mm, formado por varias filas de pelos, los más externos generalmente escábridos, los internos plumosos. $2n = 8$ (Cádiz). *Florece y fructifica de Abril a Junio.*

