

82. *Laserpitium*

- c. subsp. *lainzii* P. Monts. in Collect. Bot. [Lainzii]
(Barcelona) 26: 64 (2003)

Ind. loc.: "... inter Pedabejo & Remoña 2020 m altitudine, M. Láinz, M.^a A. García González ("Choni"), P. Montserrat et L. Villar, die 2-IX-1988 legerunt... Typus JACA279588"

lc.: Figs. 15 a, 16 c

Tallos escaposos, cortos –(5)8-12(15) cm–, estriados. Hojas (5)8-10(15) cm, 2 pinnatisectas, de color glauco, con pelos largos abundantes, tabicados, con divisiones de último orden escasas, algo carnosas, la terminal obtriangular, de base cuneada, con (5)6-8 dientes poco aparentes por tener el mucrón reflejo, aplicado al envés. Umbelas con 8-13 radios, muy ásperos. Frutos cortos –5-6 mm y más anchos–; mericarpos con alas laterales que superan el diámetro del mericarpo; vitas 13, 9 bajo las costillas y por lo menos 4 comisurales.

Grietas de roquedos calizos venteados; 1800-2010 m. V-VI. ● Picos de Europa leoneses, siempre lejos de la influencia directa cantábrica. **Esp.**: Le S?

5. *L. eliasii* Sennen & Pau in Bol. Soc. [Eliásii]
Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907)

L. nestleri subsp. *eliasii* (Sennen & Pau) M. Láinz in Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 541 (1957)

Ind. loc.: "Valverde, Foncea (Sennen et Elias)"

Hierba robusta. Cepa gruesa, con restos cintiformes, papiáceos. Tallos (20)40-60(130) cm, con 12-25 costillas de anchura desigual, pajizas, que destacan entre surcos verdes. Hojas basales (10)20-50(80) cm, 2-3(4) pinnatisectas, con estomas en su haz, divisiones terminales de último orden de 2-3 × 3-4 cm, con dientes anchos muy desiguales en su mitad superior e incisiones laterales ± profundas –hasta formar, por excepción, casi 3 folíolos–, de un verde glauco, subcoriáceas, con envés más claro, glabro y pruinoso –pero con pelos, recios, largos (0,3-1,5 mm), sin tabiques y apenas curvados, muy escasos sobre los nervios–. Umbela central fértil con (8)12-18(33) radios de (3)4-6(13) cm –más cortos, finos y numerosos en las umbelas laterales–, con 5-8 costillas desiguales, brillantes, lisas o con pocas papilas, translúcidas en su base. Brácteas 1-3(8), caedizas, lineares, apenas de borde blanco. Pétalos blancos. Frutos 6-8(11) mm; mericarpos con alas de consistencia recia, brillantes, las dorsales de 0,3-1 mm de anchura




Fig. 16.–Sección transversal de un mericarpo de *Laserpitium nestleri*: a) subsp. *nestleri*, b) subsp. *flabellatum*, c) subsp. *lainzii*.