

82. Laserpitium

y poco más las laterales; vitas 11, las 2 comisurales y las 4 valeculares grandes, las 5 de las costillas primarias muy pequeñas y poco visibles.

Orlas de robleales, parameras, pastos de montaña; (400)800-1300(1790) m. V-VII. ● N de Portugal, Sanabria, Galicia-Pirineo occidental y Montes Ibéricos. **Esp.:** Bi Bu Hu Le Lo Lu Na O Or P (S) So SS Vi Z Za **Port.:** Mi TM (BA).

1. Fruto elipsoidal-oblongo, con alas estrechas –0,2-0,5 mm–; divisiones foliares de último orden suborbiculares **b. subsp. ordunae**
- Fruto elipsoidal, con alas anchas –0,5-1,8 mm–; divisiones foliares de último orden de forma variable 2
2. Planta de 30-70(100) cm, con pocas hojas caulinares –agrupadas en el tercio basal–, 3 pinnatisectas; radio umbelar liso, brillante, con pocas papilas basales translúcidas **a. subsp. eliasii**
- Planta de 80-130 cm, con muchas hojas caulinares, 3(4) pinnatisectas, de folíolo pequeño y nervadura más destacada en el envés; radio umbelar algo áspero en su parte basal y con muchas brácteas caedizas en las umbelas laterales **c. subsp. thalictrifolium**

a. subsp. eliasii

lc.: Figs. 17 a, 18 b; lám. 124 i

Hierba de (20)40-70(100) cm, subescaposa. Hojas de consistencia carnosa –hasta subcoriácea en ambiente soleado– y con pelo ralo que suele faltar; las basales (10)20-40 cm, 2-3 pinnatisectas, con divisiones de último orden suborbicular-ovadas, distantes, la terminal –2-3 × 3-4 cm, con incisión profunda, dientes desiguales y mucrón corto, romo; las caulinares agrupadas en el tercio inferior, 3 pinnatisectas. Umbelas con (8)12-18(33) radios de 4-6(13) cm, el central recio, con 5-8 costillas desiguales, lisas, brillantes, con pocas papilas basales, translúcidas. Brácteas lineares, de borde blanquecino, caedizas –algunas suelen persistir–. Frutos 6-8(10) mm; mericarpos con alas de 0,5-1 mm, subiguales, todas recias.




Fig. 17.–Detalle de una hoja de *Laserpitium eliasii*: a) subsp. *eliasii*, b) subsp. *ordunae*, c) subsp. *thalictrifolium*.