




Márgenes de cursos de agua.
Frecuente. Pedroches, Sierra Norte,
Aracena, Andévalo, Condado-Aljarafe,
Vega, Grazalema, Algeciras.
Distribución general. W de Europa,
Región Mediterránea.

3. *Oenanthe crocata* L., *Sp. Pl.* 254 (1753)

Tubérculos elípticos u obovados. Tallos de hasta 150 cm, huecos, estriados. Hojas basales 2-3 (-4) pinnatisectas, con segmentos de último orden ovados y lobados; las caulinares de 2 (-3) pinnatisectas, con segmentos de último orden ovados y lobados o lineares y enteros. Umbela central con (-6) 12-30 (-40) radios, sin brácteas y con numerosas bracteolas subuladas. Dientes del cáliz de 0,5-1 mm. Frutos de 3,5-5,6 × 1-1,8 mm, oblongoideos, pedicelados. Estilos de 2,1-2,6 (-4) mm. $2n = 22$ (Cádiz, Huelva, Sevilla). *Florece de Mayo a Julio.*



Suelos húmedos o encharcados en las
cercanías de ríos arroyos. Condado-
Aljarafe, Vega, Litoral, Grazalema,
Algeciras.
Distribución general. W y C de
Europa, Región Mediterránea.

4. *Oenanthe fistulosa* L., *Sp. Pl.* 254 (1753)

Tubérculos fusiformes u ovoideos. Tallos de hasta 100 cm., huecos, estriados. Hojas basales 1-2 pinnatisectas, con lóbulos terminales lineares; las caulinares pinnatisectas, con segmentos terminales lineares. Umbela central con 2-4 radios y 0 (-2) brácteas. Umbelas de segundo orden globosas en la fructificación, con numerosas bracteolas delgadas a subuladas. Dientes del cáliz de 1,2-1,6 mm. Frutos de 3,3-4 (-5) × 1,9-2,4 mm, obcónicos, rara vez oblongoideos, sentados. Estilos de 2,2-3,7 mm. $2n = 22$ (Cádiz). *Florece de (Abril) Mayo a Julio.*

