

36. *Otospermum* Willk., *Bot. Zeit. (Berlin)* 22: 251 (1864) (*)

Hierbas anuales, caulescentes. Hojas pinnatisectas. Capítulos pedunculados. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas involucrales con margen escarioso oscuro. Receptáculo anchamente cónico, sin brácteas interseminales. Capítulos radiados y heterógamos, con flores externas hemiliguladas, femeninas, blancas, e internas flosculosas y hermafroditas. Aquenios obpiramidal-truncados, ligeramente curvados, con 4-6 costillas longitudinales; los externos con una semicorona coriácea hacia la parte ventral; los internos con un retículo membranoso transversal entre las costillas.



Herbazales sobre suelos arcillosos. Litoral, Marisma, Campiña Baja gaditana, Campiña Alta sevillana, Subbética sevillana, Grazalema, Algeciras.

Distribución general. S de España, S de Portugal, NW de Marruecos.


1. *Otospermum glabrum* (Lag.) Willk., *Bot. Zeit. (Berlin)* 22: 251 (1864)

Pyrethrum glabrum Lag., *Gen. Sp. Nov.* 30 (1816)

Matricaria glabra (Lag.) Ball, *Journ. Linn. Soc. London (Bot.)* 16: 511 (1878)

Otocarpum glabrum (Lag.) Willk., *Illustr. Fl. Hisp.* 2: 145 (1889)

Glabrescentes. Tallos de (10-) 15-30 (-40) cm, erectos, estriados longitudinalmente, ramificados en el tercio superior. Hojas tri-pinnatisectas, con lóbulos lineares, subulados. Involucro de 4-8 × 7-10 mm en la fructificación. Brácteas involucrales, al menos las internas, linear-elípticas, obtusas. Flores hemiliguladas con limbo de 8-14 mm, fértiles; las flosculosas de c. 3 mm. Aquenios dimórficos; los más externos de c. 4 mm, con 1 costilla dorsal, 2 laterales y 1-3 ventrales, y con una semicorona de 1-2,2 mm, generalmente soldados por la base a la bráctea interna; los internos de c. 3 mm, obpiramidales, con 5 costillas y una semicorona de menos de 1 mm. $2n = 18$. *Florece y fructifica de Marzo a Mayo (Junio).*



37. *Leucanthemum* Miller, *Gard. Dict. Abr. ed.* 4 (1754) (*)

Hierbas anuales o perennes, caulescentes. Hojas de serradas a lobadas. Capítulos solitarios. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas involucrales al menos con el ápice escarioso y generalmente oscuro. Receptáculo plano o hemisférico, sin brácteas interseminales. Capítulos radiados y heterógamos, con flores externas hemiliguladas, femeninas o neutras, blancas, e internas flosculosas y hermafroditas. Flores flosculosas con tubo comprimido en la base y desigualmente decurrente sobre el ovario. Aquenios homomorfos, subcilíndricos, ligeramente incurvos, con (7-) 10 (-11) costillas longitudinales. Vilano reducido a una corona escariosa o ausente.

Perenne. Brácteas involucrales agudas 1. *sylvaticum*
Anual. Brácteas involucrales obtusas 2. *paludosum*

(*) Por S. Talavera