



Sotobosques de pinares, encinares y matorrales. Pedroches, Sierra Norte, Aracena, Condado-Aljarafe, Véga, Grazales.  
 Distribución general. C y W de la Región Mediterránea.

**3. Conopodium capillifolium** (Guss.) Boiss., *Voy. Bot. Midi Esp.* 2: 736 (1845)

*Myrrhis capillifolia* Guss., *Fl. Sic. Prodr.* 1: 351 (1827)

*Conopodium subcarneum* (Boiss. & Reuter) Boiss. & Reuter in Boiss., *Voy. Bot. Midi Esp.* 2: 736 (1845)

*C. marianum* Lange, *Vid. Meddel. Dansk Naturh. Foren. Kjøbenhavn* 1878: 232 (1878)

*C. elatum* Willk., *Österr. Bot. Zeitschr.* 13: 83 (1891)

Tubérculos de 1-3,5 cm. Tallos de hasta 110 cm. Hojas basales largamente pecioladas, 3-pinnatisectas, con lóbulos terminales setáceo-subulados, mucronados; las caulinares pecioladas o, las más superiores, sentadas, 2-3 pinnatisectas. Umbelas con (8-) 10-25 (-30) radios y 0 (-2) brácteas. Umbelas de segundo orden con 4-10 bracteolas setáceo-subuladas. Mericarpos de 2,3-5 × 0,2-0,5 mm, subovales, pardos, con 1 vita por valécula y 2 vitas comisurales. Estilos de 0,1-0,7 mm. Endospermo plano. 2n = 22 (Huelva, Sevilla). *Florece en Mayo; fructifica de Junio a Julio.*



**12. Pimpinella** L., *Sp. Pl.* 263 (1753) [*Gen. Pl.*, ed. 5, 128, 1754] (\*)


Hierbas perennes, puberulentas. Hojas (1-) 2 pinnatisectas. Inflorescencias con 0 (-1) brácteas y sin bracteolas. Dientes del cáliz ausentes. Pétalos enteros, vilosos en la cara externa, blancos. Frutos de ovoides a subsféricos, densamente vilosos incluso en la cara comisural de cada mericarpo, con costillas primarias reducidas a finos salientes longitudinales, con numerosas vitas. Endospermo cóncavo-sinuado.



Matorrales degradados y bordes de caminos, preferentemente sobre suelos ácidos. Pedroches, Sierra Norte, Aracena, Condado-Aljarafe, Véga, Alcores, Litoral, Grazales, Algeciras.  
 Distribución general. Península Ibérica, NW de África, Macaronesia (Azores).

**1. Pimpinella villosa** Schousboe, *Kong. Danske Vid. Selsk. Skr.*, ser. 3, 1: 139 (1800)

Tallos de hasta 85 cm, muy ramificados, puberulentos. Hojas basales (1-) 2 pinnatisectas, con lóbulos terminales ovados, obovados u obtriangulares, frecuentemente asimétricos, crenados en la parte superior, con pecíolos y nervios frecuentemente tomentosos y margen ciliado; las caulinares reducidas a una corta lámina linear o deltoidea. Umbelas con 3-8 radios puberulentos. Frutos de 1,7-3 (-4) × 1,5-1,9 (-2,5) mm. Estilos de (1-) 1,5-2,7 mm. 2n = 18, 20 (Sevilla). *Florece de Mayo a Julio.*



(\*) Por F. García Martín