

6. Anthriscus Pers., *Syn. Pl.* 1: 320 (1805), nom. cons. (*)

Hierbas anuales. Hojas 3-pinnatisectas. Inflorescencias sin bráctas o con 1 bráctea, con bracteolas. Parte superior de los pedúnculos fructíferos con una corona de espinas pequeñas blancas. Dientes del cáliz ausentes. Pétalos enteros, con ápice inflexo, blancos. Frutos ovoideos, con pico bien desarrollado y pelos ganchudos abundantes, sin costillas aparentes; vitas no aparentes. Carpóforo bifido a nivel del pico. Endospermo cóncavo.




Pastizales y terrenos incultos.
Frecuente. Todo el territorio.
Distribución general. W, C y S de
Europa, NW de África, Turquía.

1. Anthriscus caucalis Bieb., *Fl. Taur.-Cauc.* 1: 230 (1808)

Scandix anthriscus L., *Sp. Pl.* 257 (1753)
Anthriscus vulgaris Pers., *Syn. Pl.* 1: 320 (1805)

Tallos de hasta 80 cm, generalmente muy ramificados. Hojas basales (2-) 3-pinnatisectas, pubescentes por el envés, con lóbulos terminales con margen hialino estrecho, ciliados, mucronados. Umbelas con (1-) 2-6 radios. Involucro sin bráctas o con 1 bráctea linear y aristada. Umbelas de segundo orden con 3-5 bracteolas, linear-lanceoladas, ciliadas y aristadas. Fruto de 3-4 x 0,8-2 mm, incluido el pico; pico de 1-2 mm. Estigma sentado o subsentado. 2n = 14 (Cádiz). *Florece de Abril a Junio.*



7. Scandix L., *Sp. Pl.* 256 (1753) [*Gen. Pl.*, ed. 5: 124, 1754] (*)

Hierbas anuales. Hojas 2-3 pinnatisectas. Inflorescencias sin bráctas, con bracteolas pinnadas o bífidas, rara vez laciniadas o enteras. Dientes del cáliz ausentes o muy reducidos. Pétalos frecuentemente radiados, blancos. Frutos cilíndricos o subcilíndricos, hispídeos, con un pico largo y costillas bien marcadas; vitas no aparentes o 1 por valécula y 2 comisurales.


- | | |
|--|-------------------|
| 1. Bracteolas pinnadas | 3. stellata |
| 1. Bracteolas enteras o bífidas | 2 |
| 2. Frutos maduros de 40-85 mm. Estilos de 0,9-2 mm | 1. pecten-veneris |
| 2. Frutos maduros de 20-40 mm. Estilos de 0,2-0,3 mm | 2. australis |



Márgenes de carreteras, cultivos y campos incultos. Frecuente. Todo el territorio.
Distribución general. W, C y S de Europa, N de África, SW de Asia, Macaronesia.

1. Scandix pecten-veneris L., *Sp. Pl.* 256 (1753)

Tallos de hasta 45 cm, frecuentemente pubescentes. Hojas basales 2-3 pinnatisectas, con pecíolo y nervios frecuentemente pubescentes; con lóbulos terminales lineares, a veces ciliados. Hojas lineares 2-pinnatisectas. Umbelas con 1-2 radios, sin involucro. Involucelo con (3-) 4-7 bracteolas bífidas, rara vez laciniadas o enteras, frecuentemente ciliadas. Frutos de 40-85 mm. Pico comprimido dorsalmente, de 3-6 veces más largo que la parte portadora de la semilla; con 1 vita por valécula y 2 vitas comisurales. Estilos de 0,9-2 mm. 2n = 26 (Sevilla). *Florece de (Febrero) Marzo a Junio.*



(*) Por F. García Martín